

開成宮農経済センターだより 令和4年4月

TEL 83-5165



よみがわぬ西ノトキキョウ
西湘きんじろう

【う め】*下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

病害虫防除

4月上中旬 かいよう病 マイコシールド 収穫21日前 4回 1,500倍 66g/水100ℓ

黒星病 ベルコート水和剤 収穫30日前 3回 2,000倍 50g/水100ℓ

アブラムシ類・蚜類 マブリック水和剤20(劇) 収穫21日前 2回 4,000倍 25g/水100ℓ

4月下旬 かいよう病 マイコシールド 収穫21日前 4回 1,500倍 66g/水100ℓ

黒星病 ストロビードライフロアブル 収穫7日前 3回 3,000倍 33g/水100ℓ

摘果 4月下旬～5月上旬

果実の大きさが大豆程になった頃が適期です。早く仕上げるほど、肥大はよくなります。

樹木の着果量を確認して小玉果や群状結実しているところを摘果しましょう。

特に梅酒用品種は早期大玉果の出荷が高単価につながります。

【キウイフルーツ】

安定した価格で取引されています。高品質な果実生産のため、防除を徹底しましょう。

4月中下旬 花腐細菌病・かいよう病 コサイド3000 2,000倍 50g/水100ℓ
(薬害軽減のためクレフノン200倍を加用する)

【温州みかん・中晩柑】 *下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

病害虫防除

4月上旬

ミカンハダニ アタックオイル又はハーベストオイル 100倍 1,000ml/水100ℓ
(ハダニ防除は冬季に散布した場合は不要)(3月散布の場合は80倍)

4月上中旬 (温州みかん)

そうか病 イデクリーン水和剤 500倍 200g/水100ℓ
(薬害軽減のためクレフノン200倍を加用する)

又は デランフロアブル(劇) 収穫前30日 3回 1,000倍 100g/水100ℓ

※イデクリーン水和剤はマシン油乳剤との混用およびマシン油乳剤散布後14日以内の近接散布は避けてください。

【か き】

病害虫防除 4月下旬～5月上旬

カイガラムシ類・アザミウマ類 モスピラン顆粒水溶剤(劇) 収穫前日 3回 4000倍 25g/100ℓ
落葉病 エムダイファー水和剤 収穫45日前 2回 650倍 153g/100ℓ

【いちじく】*下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

施肥 4月中旬

春肥 有機配合肥料 100kg/10a (樹勢により調整する)

早すぎると初期生育が良くなりすぎ、節間が長くなり結果数が減り収量の減少につながるので注意する。

病害虫防除 4月

○カミキリムシ類 ガットサイドS 原液塗布(株元から結果母枝まで塗布) 収穫7日前 3回 又は

○アイノキクイムシ 1.5倍液を主幹部に散布 収穫7日前 3回 (1.5倍散布はアイノキクイムシのみ登録あり)

栽培管理

3月中旬～5月上旬 晩霜・主幹日焼け対策

樹液が動き始める3月中旬頃は晩霜被害が出やすい(特に主枝部分)ので、稲わら等をのせて縛り防寒しましょう。雨に濡れないようビニールで覆うと効果的です。

4月中下旬 敷きわら

降雨の泥跳ねによる病害防止と梅雨明け後の乾燥防止のために、主枝の下に幅1m前後で敷きましょう。

【水 稲】

塩水選 水10%に対してうるち種子は 塩2.15kg、もちは 塩1.26kgを目安としてください。

浮いたモミを取り除き、底に沈み充実した種モミを種子として使用します。

種子消毒 **塗抹処理**（農薬液と種子を一緒に混ぜ、種子に均等に付着させる方法。）

種モミは十分に乾燥させ使用する。薬液量は種モミ重の3%で、種モミをかき混ぜながら薬液を垂らし付着させる。処理後も薬剤の効力は持続するので、処理後貯蔵することも可能。

（例）乾燥種子10kg 薬液300ml （テクリードCフロアブル40ml＋スミチオン乳剤3ml＋水257ml）

* 種子消毒には浸漬処理もありますが、農薬の廃液が生じない塗抹処理が望ましい。

浸 種

消毒済の種モミは、水切り後自然乾燥（水洗いはしない）し水道水に浸して催芽（ハト胸状態）させましょう。有効な水温は10℃以上です。目安は水温の積算温度100℃（20℃の場合5日）です。

播 種・出 芽

播種量：催芽モミで150g／箱

育苗土消毒 ・播種直前 1箱当たりタチガレエースM粉剤＋ダコニール粉剤（15～20g）

又はナエファイン粉剤（6～8g）を土（山土の場合、上記ダコニール粉剤を加用する）と混合する。

・播種時 1箱あたりタチガレエースM液剤（1000倍）＋ダコニール1000（1000倍）の混合液500mlをかん水し、その後播種する。

箱育苗用肥料：20g／箱（育苗土に配合されている場合は必要なし）

温度管理：積算温度60～64℃で出芽させる。育苗器の場合、30℃で2～3日。

育苗管理

1cm程度出芽したら、平らに並べ育苗する。

昼間：20～25℃、夜間18℃程度で、概ね7日間で緑化させる。床土保温のため、箱を広げた日の夕方はかん水を行わず、急激な温度変化を避けましょう。

【野 菜】

定植準備 3月下旬より

定植約半月前、苦土夕加と堆肥を施用し、よく耕耘して野菜苗の定植準備をしましょう。

購入した苗を定植する場合、栽培環境に慣らすためすぐに定植せず1週間程度は日当たりのよい軒下等で管理しましょう。また、定植数日前にマルチをかけ地温を高めておくと根の活着が良くなります。

元 肥 定植前に施しましょう。1aあたりの使用量

	ジシアンS 806	ようりん
トマト	13kg	3.5kg
ナス	15kg	2.5kg
キュウリ	15kg	4.0kg

【お 茶】

施 肥 4月 芽出し肥 摘採20～30日前に10aあたり硫安40kg（2回に分けて行う）

一番茶の摘採

本茶の摘採 4～5葉展開を待ち1芯3～4葉を摘みましょう。

刈番茶の摘採 遅れ芽が揃ってから行いましょう。（摘採後7～15日）

一番茶の摘採面で刈る事がポイントです。

一番茶の刈り残し（残してきた1～2節）を絶対にとらないこと。

※摘採後は生葉ムシに注意し、日陰の涼しい所で管理しましょう。

農薬を使用する際は、適用作物・希釈倍数・使用回数・使用方法等の使用基準を遵守するとともに飛散防止に努め、ラベルをよく確認し、必ずラベルに基づいて使用しましょう。

【お茶刈機点検整備会の開催のご案内】

お茶刈機の整備・点検を希望される方は、下記の最寄り会場までご持参下さい。

開催日	会場	受付時間
令和4年4月1日(金)	岡本支店	9:30~14:00
令和4年4月7日(木)	久野営農経済センター	9:30~14:00

※ 4月1日(金)～7日(木)の期間中、西部農機・自動車センターでも受付致します。
持参いただくか、事前に各営農経済センターへお届け願います。

～お知らせ～

令和4年度作物別手引き(栽培編・防除編)の更新について

みだしの件、「令和4年度版作物別手引き(栽培編・防除編)」を作成いたしましたので、ご活用
頂くようお願いいたします。

また、令和4年度より作物別手引き書につきましては、冊子での作成・配布は行いませんので、
手引き書の取得に際しては、最寄りの営農経済センター窓口までご所望の作物をお申し付け頂く
よう願います。各営農経済センター窓口には手引き書用のラックも設置されておりますので、そ
ちらも合わせてご活用頂きますよう、よろしく願います。

※栽培編につきましては当組合ホームページへも掲載しておりますので、そちらでも閲覧できま
す。令和4年4月1日より掲載。(当組合 HP : <https://ja-kanasei.or.jp/>まで)

【野菜苗・しょうが種子受渡日のご案内】

※令和4年度も、自己取り対応になりますのでご注意ください。

管内	日時	引渡場所
福沢支店管内	令和4年4月14日(木) 9:00~11:00	福沢支店
松田支店管内	令和4年4月14日(木) 14:00~16:00	松田支店
開成支店管内	令和4年4月15日(金) 9:00~11:00	開成営農経済センター
大井支店管内	令和4年4月19日(火) 9:00~11:00	大井支店
岡本支店管内	令和4年4月20日(水) 9:00~11:00	岡本支店
南足柄支店管内	令和4年4月22日(金) 9:00~11:00	南足柄支店
松田支店(寄管内)	令和4年4月27日(水) 9:00~10:00	寄自然休養村管理センター
南足柄支店管内 (北足柄管内)	令和4年4月27日(水) 9:00~10:00	矢倉沢公民館
	令和4年4月27日(水) 13:00~14:00	内山公民館

※自己取りの際、**コンテナ等の容器をご用意願います。**

開成営農経済センターからのお知らせ

お米の日	神奈川県産の玄米を特別価格で販売します。(毎月第2・第4火曜日) ・はるみ玄米(1kg)480円→440円(税込)・キヌヒカリ玄米(1kg)430円→390円(税込) 4月は12日・26日となります。
棚卸の日	月末(4/28)は棚卸のため、15時に閉店致します。 尚、コイン精米機は17時まで営業致します。

回覧の注文書について

「バイオリサカミキリスリム」「スイコー農業用品」「やまびこ製品」「丸山製品」
「梅干用資材」「省力園芸資材」「スクミリンゴガイ駆除剤」「足柄茶新茶」
※お申し込みのお忘れがないようご注意ください。

果樹・野菜春農薬 水稻肥料・農薬 の自己取りについて

予約注文(自己取り)をご注文されている方は、
令和4年4月5日(火)～令和4年4月15日(金)
8:40～17:00までに取りに来てください。

※農薬名に網掛けがあるものは購入時に印鑑が必要となります。

農薬を使用する際は、使用基準を遵守し、必ずラベルの表示に基づいて使用しましょう。

農薬散布の際はマスク・防除着を着用し、風の強い日の散布は避け、
風向きに注意し、飛散防止に努めましょう。