

月	栽 培 管 理	
	管 理	内 容
2	【春 肥】 (二回に分肥する)	2月下旬 足柄茶配合 033 3袋/10a
3		3月中旬 足柄茶配合 033 2袋/10a
4		【芽出し肥】 摘採 20～30 日前に施す。 硫安 2袋/10a
5	【一番茶の摘採】 【株ならし】 【刈番茶の摘採】	(本茶の摘採) 4～5 葉展開を待ち 3～4 葉を摘む。 (摘採後 7～15 日) 遅れ芽が揃ってから行う。
	【更 新】 樹高が高くなりすぎた園や極端な芽数型の園は深刈りや中切り更新する。	
6	【防除】 ※重点作業	二番茶前に 1 回、二番茶後に 2 回の防除を目安に行う。 (もち病・炭疽病・ヨコバイ・ハマキ・ハダニ)
	【夏 肥】	二番茶摘採 15 日前 硫安 2袋/10a 二番茶摘採後 なたね粕 5袋/10a
7	【二番茶の摘採】	一番茶摘採後 45 日を目安とする。 摘採の適期が短いので注意する。
7	【夏整枝】	摘採の 10 日後頃に遅れた芽を刈り落とす。
8	【土壌改良】	8 月中旬までに苦土石灰 120 kg とうね間の整枝葉などの有機物をすきこむ。 (注) 少雨・乾燥が続く場合は行わない。
9	【秋 肥】 (二回に分肥する)	8 月下旬 足柄茶配合 033 4袋/10a
		9 月中旬 足柄茶配合 033 4袋/10a
10	【秋整枝】	10 月上中旬 翌年の一番茶のために摘採面を揃える。二番茶摘採位置もしくは二番茶整枝位置の 5cm 上を秋整枝位置の目安とする。
	【敷ワラ】 秋整枝以降	冬季の乾燥と寒害の防止のため。