

作物名 **非結球シタス (リーフレタス) (キク科)**

J A 2022 版

標準作型

○印・播種 △印・定植 □印・収穫

| 作 型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 露 地 | | ○ | △ | | | | | ○ | △ | | | |

栽培のポイント

30℃以上の高温時には発芽しにくくなるので、涼しい所で発芽させること。
高温で抽台するため、高温期の栽培は晩抽性の品種を選定する。

畑の準備 酸性土壌に弱いので、植付けの1~2週間前には苦土石灰(10kg/a)、堆肥(100kg/a)を施しておく。

元 肥 (1 a 当たり使用量)

| | | |
|---------------|-------|--------|
| 化成肥料 14-14-14 | 10 kg | 播種・定植前 |
|---------------|-------|--------|

播 種 (種まき) 種子は好光性なので覆土は薄くする。また、30℃以上の高温では発芽しにくいので、発芽するまでは濡らした新聞紙をかけ涼しい場所に置く。
直まきの場合、1箇所4~5粒まく。

定 植 本葉が4~5枚になったら畑に定植する。
マルチをしておくこと、降雨時の泥はねを防ぎ病気を予防することが出来る。

間引き 本葉4~5枚になったら、1本立ちにする。

追 肥 生育期間が短いので、元肥を施している場合は追肥の必要はない。葉の色が薄い場合などは追肥する。

収 穫 20㍻程で収穫できる。外葉から1枚ずつ収穫していくこともできる。

防 除 べと病、すそ枯病、灰色かび病について、初期防除を徹底する。