

山北宮農だより

令和4年8月

TEL: 75-0004



西湘きんご

——【温州みかん】*下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょう。——

病害虫防除

7月下旬～8月中旬

○黒点病

ペンコゼブ水和剤又はジマンダイセン水和剤600倍 166g/水100ℓ
収穫30日前 4回

○ヤノネカイガラムシ

エルサン乳剤(劇) 1,500倍 66 ml/水100ℓ 収穫14日前 2回

○ミカンサビダニ

ダニカット乳剤20 1,500倍 66ml/水100ℓ 収穫14日前 1回

8月下旬～9月上旬

○黒点病

ペンコゼブ水和剤又はジマンダイセン水和剤 600倍 166g/水100ℓ
収穫30日前 4回

○ミカンハダニ
○ミカンサビダニ

ダブルフェースフロアブル 3,000倍 33ml/水100ℓ 収穫前日 1回

又は
ダニゲッターフロアブル 2,000倍 50ml/水100ℓ 収穫前日 1回

○チャノキイロアザミウマ
カメムシ類
ヤノネカイガラムシ

スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 50g/水100ℓ 収穫前日 3回

品質向上対策

①熟期促進を目的に、フィガロン乳剤の散布

満開後90日と110日の2回 3,000倍 300ℓ/10a

②タイバックシートの利用 敷設は8月中、取り外しは収穫前に行う

着色向上を目的の場合は、樹冠下に敷く(部分被覆)

着色向上と増糖・除草を目的の場合には、園内全体に敷く(全面被覆)

——【中晩柑】——

はるみ・不知火は、初秋の乾燥で細根が枯死しやすいため、水分ストレスを受けやすく、小玉、高酸果の原因になります。敷わらマルチ、ナギナタガヤの草生栽培により梅雨明け後から秋にかけての土壌の過乾燥を防ぎましょう。著しく乾燥が続く場合は灌水も検討しましょう。また、1果当たり100葉を基準に早めの摘果をしましょう。

特にはるみは着果量が多いと樹勢の低下や枯死の原因になりますので、樹冠上部1/3から1/4は必ず全摘果をしましょう。

——【SG21 令和4年度新規会員募集について】——

湘南ゴールドの生産・販売組織『SG21』の会員を下記の通り募集いたします。

SG21では会員向けに栽培講習会や出荷に向けた目合わせなど湘南ゴールド生産者の支援を行っています。加入希望の方はお申し込みください。

下記の通り募集いたしますので、加入希望の方はお申し込みください。

- ・事業年度：令和4年7月1日～令和5年6月30日
- ・年会費：1,000円/年額
- ・申し込み：各営農経済センター・申込期限：令和4年8月26日(金)まで
- ・お問合せ：営農部営農指導課(46-6950)

——【う め】——

夏季剪定

8月中旬～9月中旬まで

縮間伐を行い周囲から光が当たるようにするとともに、立ち枝(覆う枝)の間引きで樹の内部まで光が入るようにして翌年の花芽の充実を図りましょう。8月中に終わると効果が高いです。

(小梅や樹勢が弱っている樹は、夏季剪定は控えめにしましょう。)

— 【キウイフルーツ】 —

夏季剪定終了後に発生した夏枝や、剪定した部分から出る新梢が巻きついた部分を取り除きます。結果枝の葉を充実させ、果実へ養分が行きやすくするために、新梢を伸ばさないようにしましょう。
※カメムシ発生時は、スタークル顆粒水溶剤2,000倍 50g/水100ℓを散布（収穫前日 3回）

乾燥防止対策

初期肥大の時期には土壌を乾燥させないようにしましょう（敷わら・灌水）

— 【お茶】 *下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょ。 —

土づくり

8月中旬までに苦土石灰120kgと有機物をすきこみ30cmくらいの深さに行いましょう。

病害虫防除

8月上旬～中旬

○チャノミドリヒメヨコバイ ロディー乳剤（劇）1,000倍 100 ml/水100ℓ 摘採7日前 1回

チャノキイロアザミウマ

チャノホソガ

チャハマキ

チャノコカクモンハマキ

○炭疽病

オンリーワンフロアブル 3,000倍 33ml/水100ℓ 摘採7日前 2回

8月中下旬

○カンザワハダニ

ミルベノック乳剤 1,000倍 100ml/水100ℓ 摘採7日前 1回

整枝

一番茶以降、更新作業を行ってない園では、上旬をめどに整枝を行いましょ。

ただし、樹勢が極端に悪い場合は、整枝は行わないようにしましょ。

— 【水稲】 —

水管理（高温障害の対応） **重要**

出穂後20日間の平均気温が26～27℃以上の高温で推移すると、高温障害粒（乳白粒・心白粒等）が多発し、品質が低下してしまします。

出穂前15日、出穂後10日間は水を切らさないようにしましょ。

その後は、根の活力維持のため間断かん水に努めましょ。35℃以上の異常高温が予測される場合は、掛け流しかん水をするにより、圃場の気温が低下して被害を軽減することができます。

病害虫防除 **8月上旬～中旬**

○カメムシ類・ウンカ類 スタークル粒剤 3kg/10a 発生状況に注意しましょ。収穫7日前 3回

防雀網の設置 開花時に影響が無いように、出穂前に済ませましょ。

自然対策

豪雨の時 水口、水尻を閉め過剰な水路からの流入による倒伏を防ぎましょ。

泥水が入った場合には、すみやかに新鮮な水と入れ替えましょ。

強風の時 水口、水尻を閉め深水にして、風による倒伏を防ぎましょ。

農薬を使用する際は、適用作物・希釈倍数・使用回数・使用方法等の使用基準を遵守するとともに飛散防止に努め、ラベルをよく確認し、必ずラベルに基づいて使用しましょ。