



○営業時間の変更について

令和4年5月31日（火） 15:00まで営業

○西部農機センター出張サービスについて

令和4年6月17日（金） 9:30～14:00 ご利用ください。

○飲料キャンペーン実施中

10ケース以上のまとめ買いで、さらにお値引きがあります。

湘南ゴールド飲料	290g × 24本	3,400円	→	2,900円
湘南ゴールドスカッシュ	290ml × 24本	3,400円	→	2,900円
梅の風	290ml × 24本	2,350円	→	2,140円
みかん畑	195g × 30本	2,960円	→	2,800円
足柄茶リシール缶	290g × 24本	2,360円	→	2,150円
足柄茶リシール缶	490g × 24本	2,590円	→	2,300円
ほうじ茶	465g × 24本	2,590円	→	2,300円
箱根山麓紅茶	490g × 24本	2,590円	→	2,300円

—— 【柑 橘】 *下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。 ——

病害虫防除

6月中～下旬

○黒点病

シマンダイセン水和剤 600倍 166g/水100㍓

【温州みかん】収穫30日前 4回 【温州ミカンを除く】収穫90日前 4回

○ミカンハダニ

アタックオイル 又は ハーベストオイル 150倍 666ml/水100㍓

○ミカンハダニ

ハチハチフロアブル（劇） 収穫前日 2回 2,000倍 50ml/水100㍓ 又は

チャバロザミツ

コテツフロアブル（劇） 収穫前日 2回 6,000倍 16ml/水100㍓
(発生園に散布)

摘果

(大津・青島)

大津・青島は大玉果になりやすいので、隔年交互結実をさせてなり込ませます。

表年の樹はこの時期の摘果を控え、10月下旬からの仕上げ摘果で上を向いた極大果だけを摘果しましょう。裏年の樹は7月中旬に全摘果しましょう。

摘果

(不知火・はるみ)

不知火・はるみは樹冠上部に着果させると樹勢の低下につながります。

生理落果が始まったら樹勢強化の為、樹冠上部1/3～1/4は全摘果し樹勢の強化を図りましょう。

—— 【う め】 *下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。 ——

病害虫防除

6月上中旬（漬け梅に散布）

○黒星病・すす斑病 インダーフロアブル 5,000倍 収穫前日 2回 20ml/水100㍓

収 穫

収穫後の取扱いは丁寧におこないましょう。当たり傷はその時は目立たなくとも後日変色し、出荷先や購入者からのクレームの原因となります。

(梅干用) 果実表面の毛じが半分以上脱落し、果面に光沢が出てきた頃になります。

1樹を1度に収穫せず期間を空けて2回以上にわけ、未熟果は出荷をしないようにしましょう。

【キウイフルーツ】

病害虫防除 6月～8月

○カメムシ発生時 スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 収穫前日 3回 50g/水100㍓

夏肥 6月上旬

キウイ配合 80kg/10a

初期肥大促進のために重要。着果が多くなる場合は、20～40kg増量します。

摘果 2回以上に分けて摘果しましょう。

・荒摘果 6月上～中旬

奇形・扁平・傷・病害・小玉果を除去。荒摘果はできるだけ早く行くと果実肥大が良好になります。

・仕上げ摘果 6月下～7月上中旬

奇形果・傷果・小玉果から摘果する。1㎡あたり25着果を目標に摘果しましょう。

【く り】

病害虫防除 6月下旬～7月下旬

○カミキリムシ類 トラサイドA乳剤 200倍 収穫14日前 1回 500ml/水100㍓

*葉にかからないよう樹幹に散布します。

【お茶】*下線は重要防除です。必ず防除しましょう。

二番茶の摘採 一番茶摘採から45日後が目安となります。

病害虫防除 ※安全使用日数や周辺の摘採日程に十分留意し防除しましょう。

6月上旬～6月中旬 (二番茶摘採園)

○チャノドクサ

チャノドクサ

カザワガニ

チャノコナジラミ

コテツフロアブル(劇) 2,000倍 摘採7日前 2回 50ml/水100㍓

※チャトゲコナジラミを対象とする場合は6月上旬に散布する。

○チャノホソガ多発時 カスケード乳剤 4,000倍 摘採7日前 2回 25ml/水100㍓

○もち病・炭疽病 オンリーワンフロアブル 3,000倍 摘採7日前 2回 33ml/水100㍓

※新梢枯死症対策として使用する場合は2,000倍 50ml/水100㍓とします。

6月下旬～7月上旬

○輪斑病・新梢枯死症 カスミンボルドー 1,000倍 摘採14日前 2回 100g/水100㍓

*剪整枝後、出来るだけ早く(3日以内)散布しましょう。

施肥

(一番茶摘採のみの場合) 6月下旬 なたね粕 100kg/10a

(二番茶摘採を含む場合) 二番茶摘採15日前 硫安 40kg/10a

二番茶摘採後 なたね粕 100kg/10a

一番茶の芽出し肥を多く施用した方は、二番茶の芽出し肥を減らしてください。

農業を使用する際は、適用作物・希釈倍数・使用回数・使用方法等の使用基準を遵守するとともに飛散防止に努め、ラベルをよく確認し、必ずラベルに基づいて使用しましょう。