



【果 樹】

縮間伐及び園地環境の改善

高品質果実の生産、低樹高化のためには、十分な樹間距離が必要になります。密植園では、樹高が高くなり作業性が低下し、また日陰になるため高品質果実の生産が出来ません。剪定に入る前に縮間伐をして十分な樹の間隔を確保しましょう。併せて、園地の防風林等の手入れもしましょう。

【温州みかん】

施 肥

○珪土カク 200kg/10a 酸性土壌の是正が目的です。
* 葉色の悪い園(微量元素不足の可能性あり)では、マルチサポート 80kg/10a を使用

整枝剪定(大津・青島) 2月中旬以降(厳寒期を過ぎた頃)から始めましょう。

大津・青島は大果系です。剪定量が多いと大玉果となります。
中玉果の生産のために隔年で管理方法を変えましょう。

① 表年の樹

ハサミ剪定を主体で主枝の切り下げ、下垂した枝の切返し、密生した夏秋梢の整理、強い夏枝の発生部からの除去等をしてしましょう。剪定量を増やすと大玉果の原因になります。
剪定量は1割以下を目安とします。

② 裏年の樹(昨年着果が多かった樹)

ノコギリ剪定を主体に樹形を整えましょう。樹形は3本主枝の開心自然形が基本になります。
剪定量が多いと、翌年大玉果が増えますので、剪定量は2割以下を目安とします。

③ 共通

薬剤散布や収穫の作業性向上のため、樹冠内部への入り口を北側に作りましょう。
強い内向枝・病虫害被害枝・枯れ枝は除去しましょう。

【お 茶】

整 枝 3月中旬(寒害がなくなるころ)

秋整枝をしていない園では、摘採面をそろえるため浅く整枝しましょう。
秋整枝をした園で、遅れ芽や立ち葉が出ている園では再整枝(化粧ならし)をしましょう。
※ 再整枝の目的は1番茶の品質低下防止です。ごく浅く整枝しましょう。深刈りは減収につながります。

施 肥 施肥の前に敷き藁・敷き草等をよけておきましょう。

春肥は、一番茶の芽の生育と品質に効果があり、茶樹はこの時期に平均温度が10℃以上になると根が動きはじめて、樹体内の養分の転流がはじまります。
分肥(2回に分ける)土と混和させると肥効が高まります。
2月下旬と3月中旬に「足柄茶配合 100kg/10a」を2回に分肥しましょう。

定 植 3月

新植及び改植する場合は3月に行います。3月の定植に合わせ2月に定植準備をしましょう。

【か き】

病虫害防除

○ヒメコスカシバ 幼虫の生息場所をなくすため、粗皮削りを行いましょう。
※ 特に伊豆早生は被害を受けやすいため発生に注意しましょう。

整枝剪定 2月末までには終了しましょう。

樹形は開心自然形が基本になります。主枝3本を理想とし、低樹高化に取り組みましょう。
○ 柿は昨年発生した枝の先2~3芽から出た新梢に花をつけますので、
枝の先端は切り返しをせずに30~50cm毎に充実した結果母枝を配置していきます。

【キウイフルーツ】*下線が引いてあるものは重要防除です。

病虫害防除 3月中旬(発芽前)

○かいよう病 ICボルドー-66D 50倍 2,000g/水100ℓ
○キウイヒメヨコバイ アグロスリン乳剤 収穫7日前 2,000倍 50ml/水100ℓ

剪 定

剪定が終了していない園は、すみやかに剪定を終わらせましょう。

【ジャガイモ】 2月中旬~3月上旬

畑の準備

○馬鈴薯専用配合052 10kg/a 重焼リン 2kg/a
植付けの半月前までに全面施用し混和しておきます。
ジャガイモは石灰を多用すると「そうか病」の発生が多くなります。

種イモの準備と植付け

植付け前に、一片40~50gの大きさに切り2~3日程陰干しし切り口を乾かす
種イモ量の目安: 15~16kg/a
○種イモの黒あざ病による腐敗防止 ベンレート水和剤
種イモ重量の0.3~0.4%をまぶすと良い(例) 3~4g/種イモ1kg
種イモへの薬剤処理は種イモを切断する前に行いましょう
幅60㍍程の畝に深さ7~8㍍の溝をつくり、種イモの切り口を下にして30㍍間隔に植え付ける
※ 気温が高くなる場合には、種イモの萌芽が進みやすくなります。種イモは通気性の良い容器に移し替え呼吸熱がこもらないようにし、温度2~3℃の暗所で保管しましょう。
また、種イモの呼吸量が増加すると黒色心腐が発生しやすくなります。発生防止のため温度管理を徹底し高温を避け、換気を十分に行いましょう。

※ 網掛けの農薬につきましては医薬用外劇物となりますので、購入の際には印鑑が必要となります。

各行政の営農支援対策について

下記の通り各行政で支援策があります。詳細は各行政へお問い合わせ下さい。

| 行政名 | 支援内容 | 実施時期 |
|------|--|----------------------------|
| 小田原市 | 『営農継続支援金』、令和3年の年間農産物販売金額50万円以上。経費(肥料費・飼料費・農薬費・動力光熱費)の1割。上限5万円 | 令和4年10月3日 ～令和5年2月28日受付 |
| 大井町 | 『営農経営安定化支援金』、令和3年の年間農産物販売金額50万円以上。経費(肥料費・飼料費・農薬費・動力光熱費)の1割。上限10万円 | 令和4年12月9日 ～令和5年2月28日受付 |
| 中井町 | ○『臨時営農継続支援金』、令和3年の年間農産物販売金額50万円以上。経費(肥料費・飼料費・農薬費・動力光熱費・荷造運賃手数料)の1割。上限10万円 | 令和4年12月26日 ～令和5年3月15日受付 |
| | ○中井町農業振興補助金①有機農法等(有機肥料・マリーゴールド等)②鳥獣被害対策(電気柵・防鳥ネット等)に対し、令和4年1月1日から令和4年12月31日購入分の1/2以内。上限10万円。認定農家上限20万円 | 令和5年1月4日 ～令和5年1月31日受付 |

小型車両系建設機械及び農業機械利用事業講習会の開催について

| | |
|---------|---|
| 1. 開催場所 | 農業機械利用事業講習会 開催日時 令和5年3月4日(土) 【午前の部】8:30～11:30 場所 JA かながわ西湘 営農部 成田総合選果場 【午後の部】14:00～17:00 場所 JA かながわ西湘 開成事業所(開成営農経済センター) |
| 2. 申込資格 | JA管内の正組合員及びその家族 |
| 3. 申込方法 | 最寄りの支店及び営農経済センター |
| 4. 申込期日 | 【農業機械利用事業講習会】 令和5年2月10日(金)まで |

【う め】

病害虫防除 *下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょ。う。

1月
○灰星病(開花期始め)ベルコート水和剤 収穫30日前 2,000倍 50g/水100㍓
(満開期)オーシャイン水和剤 収穫前日 3,000倍 33g/水100㍓
※ 灰星病の罹病枝がわからない方は、最寄りの営農経済センターにご確認ください。
また、十郎を栽培している場合は、十郎の開花状況に合わせてましょ。う。
※ 灰星病で枯れた枝は開花期までに剪除して、園内に残さないことが重要です。

3月上旬～3月下旬
○かいよう病 コサイド3000 2,000倍 50g/水100㍓

3月中旬～3月下旬
○アブラムシ類 スミチオン乳剤 収穫14日前 2,000倍 50ml/水100㍓ 又は
チェス顆粒水和剤 収穫21日前 5,000倍 20g/水100㍓
○灰色かび病 ポリバリン水和剤 収穫30日前 1,000倍 100g/水100㍓
※ 灰色かび病の防除は、満開期・落弁期が目安となります。品種別に防除適期も異なります。適期の防除を心がけましょ。う。

【水 稲】

冬季耕うん 12月、1月に行っていない方は直ちに行いましょ。う。
冬季耕うんの主な目的は①～④となります。1～2回を目安に冬季耕うんをしましょ。う。
① 刈り株・ワラを分解しましょ。う。*田植え直前(春)にすきこむと病害虫が発生しやすくなります。
② 病害虫の越冬場所になりやすい「ひこばえ」を除去しましょ。う。(害虫を越冬させない)
③ 雑草の発生を抑えましょ。う。
草種により効果が異なりますが、多年生雑草の塊茎・種子を乾燥により減少させましょ。う。
*セリは春に耕うんすると、増えてしまいましょ。う。
④ 水稻除草剤の効果を安定させましょ。う。(田面が平らでないと効果が弱まらましょ。う。)

スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)対策
ジャンボタニシ発生水田では、寒期にロータリー耕を行い貝を掘り起こし寒気にさらすとともに破砕しましょ。う。作業速度を遅くしロータリーの回転数を高く浅めに耕うんすると効果が高まらましょ。う。

農薬を使用する際は、適用作物・希釈倍数・使用回数・使用方法等の使用基準を遵守するとともに飛散防止に努め、ラベルをよく確認し、必ずラベルに基づいて使用しましょ。う。

※ 網掛けの農薬につきましては医薬用外劇物となりますので、購入の際には印鑑が必要となります。

☆中井営農経済センターからのお知らせ☆

① 回覧・注文書の取りまとめについて
・ 野菜・果樹農薬、除草剤注文書
申込締切日：令和5年2月9日(木)までに
・ 中井管内の方は、中井営農経済センター(到着)まで
・ 相和管内の方は、相和支店(到着)まで
・ 下中管内の方は、下中集出荷場(ポスト)・前羽ポスト・下中支店(到着)までお届け下さい。

☆期間限定商品☆ みそ注文受付について



食べ頃仕込み味噌・赤
1.8kg 1,500円

他にも無添加長熟みそ 彩雪
1kg 810円 1kg 870円 など多数商品注文受付しております!!

※商品の価格は全て税込価格です。

受付期間：令和4年10月～令和5年3月まで