

4
月

久野営農経済センターだより



【TEL】 35-8010

【温州みかん・中晩柑】 *下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

病害虫防除

4月上旬

○ミカンハダニ アタックオイル又はハーベストオイル 100倍 1,000ml/水100ℓ
(ハダニ防除は冬季に散布した場合は不要) (3月散布の場合は80倍)

4月上中旬 (温州みかん)

○そうか病 イデクリーン水和剤 500倍 200g/水100ℓ
(薬害軽減のためクレフノン200倍を加用する)

又は デランフロアブル (劇) 収穫前30日 3回 1000倍 100ml/水100ℓ

※イデクリーン水和剤はマシン油乳剤との混用およびマシン油乳剤散布後14日以内の近接散布は避けてください。

【お茶】

施肥 4月 芽出し肥 摘採20~30日前に10aあたり硫安40kg (2回に分けて行う)

一番茶の摘採

本茶の摘採 4~5葉展開を待ち1芯3~4葉を摘みましょう。

刈番茶の摘採 遅れ芽が揃ってから行いましょう。(摘採後7~15日)

一番茶の摘採面で刈る事がポイントです。

一番茶の刈り残し(残してきた1~2節)を絶対にとらないこと。

※摘採後は生葉ムシに注意し、日陰の涼しい所で管理しましょう。

【梅】 *下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

病害虫防除

4月上中旬 かいよう病 マイコシールド 収穫21日前 4回 1,500倍 66g/水100ℓ

黒星病 ベルコート水和剤 収穫30日前 3回 2,000倍 50g/水100ℓ

アブラムシ類・カミ類 マブリック水和剤20 (劇) 収穫21日前 2回 4,000倍 25g/水100ℓ

又はダントツ水溶剤 収穫前日 3回 2,000倍 50g/水100ℓ

4月下旬 かいよう病 マイコシールド 収穫21日前 4回 1,500倍 66g/水100ℓ

黒星病 ストロビードライフフロアブル 収穫7日前 3回 3,000倍 33g/水100ℓ

5月上旬 黒星病・すす斑病 スコア顆粒水和剤 収穫前日 3回 3,000倍 33g/水100ℓ

<黒星病の防除について>

昨年は黒星病の発生が非常に多い年でした！4月上旬、下旬、5月上旬の春先の防除が有効になりますので徹底しましょう！特に、今まで5月上旬の防除をされていない園は、4月の防除に加え今年は必ず防除をするようにしましょう！

*2週間間隔で散布しましょう。

*前年の被害枝は切除しましょう。

摘果 4月下旬~5月上旬

果実の大きさが大豆程になった頃が適期です。早く仕上げるほど、肥大はよくなります。

樹木の着果量を確認して小玉果や群状結実しているところを摘果しましょう。

特に梅酒用品種は早期大玉果の出荷が高単価につながります。

【野菜】

定植準備 3月下旬より

定植約1ヶ月前、苦土夕加と堆肥を施用し、よく耕耘して野菜苗の定植準備をしましょう。
購入した苗を定植する場合、栽培環境に慣らすためすぐに定植せず1週間程度は畑の近くに置いておきましょう。また、定植数日前にマルチをかけ地温を高めておくと根の活着が良くなります。

元肥 定植前に施しましょう。1aあたりの使用量

	ジシアンS 806	ようりん
トマト	13kg	3.5kg
ナス	15kg	2.5kg
キュウリ	15kg	4.0kg

【かき】

病害虫防除 4月下旬～5月上旬

○カイガラムシ類・アザミウマ類 モスピラン顆粒水溶剤 (劇) 収穫前日 3回 4000倍 25g/100㎡
○落葉病 エムダイファー水和剤 収穫45日前 2回 650倍 153g/100㎡

【キウイフルーツ】

安定した価格で取引されています。高品質な果実生産のため、防除を徹底しましょう。

4月中下旬 花腐細菌病・かいよう病 コサイド3000 2,000倍 50g/水100㎡
(薬害軽減のためクレフノン200倍を加用する)

【水稲】

塩水選 水10ℓに対してうるち種子は 塩2.15kg、もちは 塩1.26kgを目安としてください。

浮いたモミを取り除き、底に沈み充実した種モミを種子として使用します。

種子消毒 塗抹処理 (農薬液と種子を一緒に混ぜ、種子に均等に付着させる方法。)

種モミは十分に乾燥させ使用する。薬液量は種モミ重の3%で、種モミをかき混ぜながら薬液を垂らし付着させる。処理後も薬剤の効力は持続するので、処理後貯蔵することも可能。

(例) 乾燥種子10kg 薬液300ml (テクリードCフロアブル40ml + スミチオン乳剤3ml + 水257ml)

* 種子消毒には浸漬処理もありますが、農薬の廃液が生じない塗抹処理が望ましい。

浸種

消毒済の種モミは、水切り後自然乾燥(水洗いはしない)し水道水に浸して催芽(ハト胸状態)させましょう。有効な水温は10℃以上です。目安は水温の積算温度100℃(20℃の場合5日)です。

播種・出芽

播種量：乾モミで150g～180g/箱

育苗土消毒 播種直前 1箱当たりタチガレエースM粉剤又はナエファイン粉剤(6～8g) + ダコニール粉剤(15～20g)を土と混合する。

播種時 1箱あたりタチガレエースM液剤(1000倍) + ダコニール1000(1000倍)の混合液500mlをかん水し、その後播種する。

育苗肥料：20g/箱(育苗土に配合されている場合は必要なし)

温度管理：積算温度60～64℃で出芽させる。育苗器の場合、30℃で2～3日。

育苗管理

1cm程度出芽したら、平らに並べ育苗する。

昼間：20～25℃、夜間18℃程度で、概ね7日間で緑化させる。床土保温のため、箱を広げてすぐの夕方のかん水はせず、急激な温度変化を避けましょう。

久野営農経済センター営業時間について

令和5年3月31日（金） 決算棚卸の為

8時40分～12時00分まで

令和5年4月 1日（土） 営業時間変更の為

8時40分～12時00分まで

令和5年4月 3日（月） 決算棚卸監査の為

13時00分～16時00分まで

（8時40分～13時00分までは休業となります）

久野営農経済センター宅配便受付時間について

令和5年4月1日より土曜日の営業時間が正午までに変更となります。

それに伴い月曜日から土曜日の宅配便受付時間を午前11時までとさせてい

たきます。

大変ご不便をお掛け致しますが組合員をはじめご利用者皆様のご理解、ご協力を賜ります様お願い申し上げます。