

【温州みかん】 \*下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

病害虫防除 5月中旬～下旬

○灰色かび病・そうか病

フロンサイドSC 2,000倍 収穫30日前 1回 50 ml/水100ℓ 又は  
ストロビードライフロアブル 3,000倍 収穫14日前 3回 33 g/水100ℓ

○コアオハナムグリ モスピラン顆粒水溶剤(劇) 4,000倍 3回 収穫14日前 25 g/水100ℓ

そうか病多発園ではフロンサイドSCを散布しましょう。\*かぶれには注意しましょう。

ミカンナガタムシ発生園では成虫の発生直前(5～6月)に樹幹及び主枝にガットサイドSを  
原液～1.5倍塗布

夏肥施用 5月下旬

特選みかん配合655 200kg/10a (吸収率を高めるため、6月中旬と2回に分けると効果的)

施肥後、軽く中耕します。反射シート被覆のため秋肥が施用できない場合は夏肥を多めにしましょう。

葉面散布 樹勢が低下している樹では尿素600倍を散布し、樹勢の回復を図りましょう。

【中晩柑】 \*下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

病害虫防除 5月中旬～5月下旬

○灰色かび病 ストロビードライフロアブル 3,000倍 収穫14日前 3回 33 g/水100ℓ  
又はフロンサイドSC 2000倍 収穫30日前 1回 50 ml/水100ℓ

※灰色かび病防除は満開から落弁期にかけて散布します(多発園は2回)

○コアオハナムグリ モスピラン顆粒水溶剤(劇) 4,000倍 収穫14日前 3回 25 g/水100ℓ

湘南ゴールド・はるみ(かいよう病に弱い品種) 5月中旬～5月下旬

○かいよう病【単用散布】

コサイド3000 2,000倍 50 g/水100ℓ

+ クレフノン 200倍 500 g/水100ℓ (葉害軽減のために加用する)

※マシン油散布とは2週間以上あける

湘南ゴールド、はるみ、レモンは、かいよう病に罹病しやすいので薬剤による防除をしましょう。

栽培管理・樹勢強化

葉面散布 5～8月に不知火・はるみの樹勢強化を目的に尿素600倍の葉面散布を行いましょう。

はるみは、着花量が多いと樹勢の低下につながります。

はるみ、不知火は上部1/3～1/4を摘蕾や早期摘果をし、樹勢の強化を図りましょう。

【お茶】

生葉管理

摘採した生葉は、長時間かごや袋につめて茶園に放置すると、品質が悪くなりますので注意しましょう。(日中の気温が高い日等は特に)

更新

樹高が高くなりすぎた園や極端な芽数型の園は、深刈りや中切り更新をしましょう。

**【梅】** \*下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

**病害虫防除** 農薬の収穫前日数を遵守しましょう。

5月上旬

○カイガラムシ類 アプロードエースフロアブル 1,000倍 収穫7日前 2回 100ml/水100ℓ又は  
モスピラン顆粒水溶剤 2000倍 収穫前日 3回 50g/水100ℓ

○黒星病・すす斑病 スコア顆粒水和剤 3,000倍 収穫前日 3回 33g/水100ℓ

5月中旬～下旬

○黒星病・すす斑病 オーシャイン水和剤 2,000倍 収穫前日 2回 50g/水100ℓ

**収 穫**

梅酒用：大きい果実から順次収穫し収穫後の直射日光は避けましょう。

漬梅用：青みが抜けた大きいものから順次収穫しましょう。

**【かき】** \*下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

**病害虫防除** 4月下旬～5月上旬

○カイガラムシ類・アザミウマ類 モスピラン顆粒水溶剤（劇） 4,000倍 収穫前日 3回 25g/水100ℓ

○落葉病 エムダイファー水和剤 650倍 収穫45日前 2回 153g/水100ℓ

**摘蕾と人工授粉**

摘蕾は伸長停止前後から開花期までに1結果枝に1蕾を基本とし、残す蕾は結果枝中央部の下向き・横向きとする。受粉作業は開花から2～3日の間に行いましょう。

**【キウイフルーツ】** \*下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

**病害虫防除**

5月上旬 花腐細菌病 環状はく皮 **（樹勢が低下している場合は実施しない）**

蕾白化期（がく割れ）5月1日頃に主幹に4～5.5mm幅で行いましょう。

5月中旬（開花前）

○カイガラムシ類 アプロードエースフロアブル 1,000倍 収穫前日 1回 100 ml/水100ℓ  
キウイヒメヨコバイ

**摘 蕾** 5月上旬～中旬

早期に側花や変形花を除去し、受粉効率と初期肥大を良くさせます。

5月の強風を考慮して花数の調整をしましょう。

**人工授粉** 5月中旬～下旬

石松子を使った受粉 5～10倍 開花2～3日までに受粉しましょう。

溶液受粉 250～300倍 希釈してから2時間以内に使い切りましょう。

**【いちじく】**

**病害虫防除** 5月上中旬

○ネコブセンチュウ ネマトリンエース粒剤 収穫60日前 1回 2kg/a（樹冠下処理、土壌によく混和する）

**芽かき** 5月中旬

手で取れる時期に芽数を整理し、結果枝の間隔を40～50cm程度にしましょう。

（狭すぎると着色不良の原因となります）

残す芽は基部に近い横芽にします。樹勢や芽の勢いによっては、上芽や下芽を利用する。

※植え付け一年目は芽かきをしない（将来結果枝のもとになるため）