



## ○営業日の変更について

令和5年6月30日(金) 15時まで営業

令和5年7月31日(月) 15時まで営業

## ○JAねっとショップのご案内

組合員様向けのネットショップサービスであり、肥料・食品等を注文することができます。

メリット1: 24時間位でもどこからでも注文することができます。

メリット2: 商品を予約注文することができ、予約商品には値引きが適用されることがあります。

メリット3: お客様の購入履歴が検索できます。以前注文した商品等を簡単に再度、注文することができます。

## 【温州みかん】

**病害虫防除** \*下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょう。

7月下旬~8月中旬

**○黒点病** ペンコゼブ水和剤 600倍 166g/水100㍓ 又は

シマンダイセン水和剤 600倍 166g/水100㍓

(温州みかん 収穫30日前 4回/温州みかんを除く 収穫90日前 4回)

○カイガラムシ類 コルト顆粒水和剤 3,000倍 33g/水100㍓ 収穫前日 3回

チャノキイロアザミウマ

○ミカンハダニ メビウスフロアブル(劇) 3,000倍 33ml/水100㍓ 収穫7日前 2回

ミカンサビダニ

アザミウマ類

**樹別摘果** (大津・青島)

裏年の樹は7月中旬に全摘果しましょう。表年の樹は、この時期の摘果を控え、10月下旬からの仕上げ摘果で上を向いた極大果だけを摘果しましょう。

## 【不知火・はるみ・湘南ゴールド】

**病害虫防除** 黒点病の防除が重要となります。必ず行いましょう。\*温州みかんの項参照(ただし、収穫前日数には注意すること。)

7月下旬~8月中旬

○ミカンハモグリガ エクシレルSE 5,000倍 20ml/水100㍓ 収穫前日 3回

アザミウマ類

○ミカンハダニ メビウスフロアブル(劇) 3,000倍 33ml/水100㍓ 収穫14日前 2回

ミカンサビダニ

アザミウマ類

**摘果**

\*不知火・はるみは樹勢維持のため、生理落果が始まったら樹冠上部1/3から1/4を全摘果します。不知火は生理落果終了後に葉100枚に1果、はるみは7月下旬までに葉120枚に1果を目安に摘果します。

\*夏季に乾燥を受けると高酸になりますので、灌水や敷き藁を行い、過乾燥を防ぎましょう。

\*湘南ゴールドは7月20日時点で果実の横径が20mm以下(1円硬貨程度)と粗皮やス上がり果の発生しやすい表層成りの果実をシンニング(摘果)する方法が有効です。

## 【レモン】

病害虫防除 7月

○かいよう病・黒点病 コサイド3000 2,000倍 50g/水100㍓ 又は  
イデクリーン水和剤 500倍 200g/水100㍓  
(薬害軽減のためクレフノン200倍を加用する)

7月下旬～8月中旬

○ミカンハモグリガ・アザミウマ類 エクシレルSE 5,000倍 20ml/水100㍓ 収穫前日 3回  
○チャノリダニ・シソビダニ・アザミウマ類 ハチ70アブル(劇) 2,000倍 50ml/水100㍓ 収穫前日 2回  
※コサイド3000、イデクリーン水和剤との混用は効果低減を招くのでしない。

## 【キウイフルーツ】

病害虫防除 7月上旬～中旬

○果実軟腐病 ナリアWDG 2,000倍 50ml/水100㍓ 収穫前日 2回  
○キウイヒメヨコバイ モスピラン顆粒水溶剤(劇) 2,000倍 50g/水100㍓ 収穫7日前 3回  
カイガラムシ類  
○カメムシ類発生時 スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 50g/水100㍓ 収穫前日 3回

**夏季剪定** 止め葉が出る6月中旬ごろより夏季剪定を実施し、棚下の明るさを維持しましょう。  
\*晴天の日で、土の表面にところどころ日が射す程度

**乾燥防止対策** 梅雨明け後の乾燥に注意。敷き藁や灌水を実施し、土壌の乾燥を防ぎましょう。

## 【お茶】

病害虫防除 \*下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょ。

6月下旬～7月上旬

○輪斑病・新梢枯死症 カスミンボルドー 1,000倍 100g/水100㍓ 摘採14日前 2回  
※剪整枝後、出来るだけ早く(3日以内)散布する。

7月中旬～7月下旬

○チャノミドリヒメヨコバイ コルト顆粒水和剤 3,000倍 33g/水100㍓ 摘採7日前 2回  
チャノキイロアザミウマ  
チャトゲコナジラミ  
※夏整枝後、2週間を目安に散布する。

### ①二番茶を摘採した場合の管理

**整枝作業**

整枝時期 二番茶摘採10日後を目安に、遅れ芽が出揃うのを待ってから行いましょう。

整枝位置 二番茶の摘採面

※整枝を怠ると摘採面が不揃いになりやすく、来年の一番茶の減収を招きやすいので、必ず行いましょう。

### ②二番茶を摘採しない場合の管理

**整枝作業**

整枝時期 7月上旬を目安に、二番茶芽が出揃うのを待ってから行いましょう。

整枝位置 一番茶摘採面の2～3cm上で行いましょう。ただし、二番茶芽が病害虫の被害で十分に生育しなかった場合は、一番茶摘採面より数cm下で整枝します。

\*整枝を怠ると芽数が少なくなり、株面の枝が不揃いになるため、来年の一番茶の減収を招くので、必ず行いましょう。

## 【う め】

病害虫防除 7月中旬～下旬

○黒星病・環紋葉枯病 トップジンM水和剤 1,500倍 66g/水100㍓ 収穫21日前 3回

礼肥の施用 5月下旬～7月中下旬

(目的) 樹勢回復と翌年の花芽充実のため。一番重要な肥料なので、必ず施用しましょう。

梅配合 120kg/10a

## 【いちじく】

病害虫防除 \*下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょう。

7月上旬

○アザミウマ類 モスピラン顆粒水溶剤(劇) 2,000倍 50g/水100㍓ 収穫前日 3回

ギボシカミキリムシ

カイガラムシ類

○疫病 ランマンフロアブル 2,000倍 50ml/水100㍓ 収穫前日 3回

7月下旬(梅雨明け後)

○ヒラメハサミヤ コテツフロアブル(劇) 2,000倍 50ml/水100㍓ 収穫前日 2回

○さび病 トリフミン水和剤 2,000倍 50g/水100㍓ 収穫前日 3回

土壌管理

いちじくの根は乾燥・過湿の両方に弱く、この時期の根の伸長具合が収量に大きく影響するので、梅雨期は排水し、梅雨明け後に乾燥が続く場合は灌水を10日に1回程度行いましょう。

\*ただし、株枯病が発生している園では病気が蔓延する恐れがあるので、掛け流し灌水は行わない

## 【か き】

病害虫防除 7月上旬～中旬 \*下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょう。

○フシコナカイガラムシ スミチオン水和剤40 1,000倍 100g/水100㍓ 収穫30日前 3回  
カメムシ類・イラガ類

○うどんこ病・落葉病 ストロビードライフフロアブル 3,000倍 33g/水100㍓ 収穫14日前 3回

カメムシ発生時の対策 7月上旬～10月下旬(夜間の飛来と加害が多いため、夕方に散布しましょう)

モスピラン顆粒水溶剤(劇) 4,000倍 25g/水100㍓ 収穫前日 3回

\*カメムシは山林から飛来して加害します。農薬散布後も、園内を良く見回しましょう。

摘果 (肥大促進・翌年の花芽分化促進)

7月中旬までに1結果母枝に2～3果、1結果枝に1果を目安に摘果をしましょう。この時期に摘果し肥大促進させないと、以後の肥大が悪くなります。

### <注意>

「収穫〇日前」：定められた使用時期。記載されている収穫前日数まで散布ができます。(前日は24時間前)

「回数」：農薬成分の総使用回数のこと。栽培期間中、何回散布可能か確認しましょう。

△△店舗により農薬の在庫状況が異なりますので、記載の農薬を購入される場合は購入先の店舗に事前に在庫確認をしていただくとスムーズに購入できます。△△

農薬を使用する際は、適用作物・希釈倍数・使用回数・使用方法等の使用基準を遵守するとともに飛散防止に努め、ラベルをよく確認し、必ずラベルに基づいて使用しましょう。