

開成宮農経済センターより 令和5年12月
TEL 83-5165

開成宮農経済センターからのお知らせ

今月の注文書等について

「水稻種子」「水稻苗」「果樹・野菜春肥料」「野菜・果樹春農薬、除草剤」
「JA 本職用土農具・小農具」「茶樹苗木」
※お申し込みのお忘れがないようにご注意ください。

12月の自己取り商品について

ご準備ができ次第、ご連絡いたしますので、ご来店お願い致します。

技術顧問の日 (園芸相談)	農業の専門家が農作業の相談に応じます。(金曜午後と土曜は不在です。) 2日・7日・9日・16日・23日は不在となります。 (※上記以外は在席予定となっておりますが、都合により不在の場合がございます。)
お米の日	神奈川県産の玄米を特別価格で販売します。(毎月第2・第4火曜日) 12月12日・26日となります。

年末年始・宮農経済センター・グリーンセンター営業のご案内

〇年 末 令和5年12月29日(金) 13時まで営業致します。

〇年 始 令和6年1月4日(木) 8時40分から営業致します。

グリーンセンター宅配集荷 年末年始の受付日変更のお知らせ

12月の1ヶ月間は、土日および祝日の集荷受付がありませんのでご注意下さい。

また、この期間の期日指定・時間指定も取扱できません。

ご不便をお掛けいたしますが、ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。

年内取扱い終了日は12月25日(月)まで。

年始取り扱い開始日は1月4日(木)から。

—【うめ】—

冬季剪定 11月～12月

縮間伐と骨格作りを重視して主枝を配置し、内向枝・平行枝等の切除をします。

※ツボミを傷めないように、年内にノコギリ剪定（太い枝の処理）を終了させましょう。

1月下旬までに細部の剪定作業（整枝・剪定）を終えましょう。1年枝は全部取らず横から出ている弱い枝は残しておきましょう。

病害虫防除 12月下旬～1月上旬（開花前）

○カイガラムシ類・**越冬病害虫** 石灰硫黄合剤 7倍 14.2 ツル／水 100 ツル

12月～1月上旬 休眠期（落葉後～萌芽前）

○コスカシバ フェニックスフロアブル 200倍 1回 0.5 ツル/100 ツル

樹幹部及び主枝に散布 開花期まで

—【キウイフルーツ】—

整枝剪定 12月下旬～2月上旬（樹液の流動が始まる前に終了しましょう。）

一文字整枝を基本に主枝・亜主枝を明確にして、亜主枝は2～3m間隔で配置します。高樹齢樹は樹がいたむため亜主枝の更新は避けましょう。古い亜主枝でも葉数を確保し維持しましょう。

古い側枝（結果母枝）は先追いしないよう、亜主枝、主枝に近づける、切り戻し更新を行いましょう。

結果母枝は、充実した新梢と本年の結果枝を併用し配置します。春の風害を想定し、やや多めに残しましょう。大きい切り口（500円玉硬貨程度の太さ以上）にはトップシンMペーストを塗布しましょう。

病害虫防除 11月下旬～12月中旬

○かいよう病 I Cボルドー-66D 50倍 2kg／水 100 ツル

土壌管理 11月～2月

土壌改良剤として、苦土石灰の施用をしましょう。 100kg～200kg／10a

—【温州みかん】*下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょう。—

収穫 丁寧な収穫作業と貯蔵の管理を徹底しましょう。

貯蔵みかんの品質のバラつきをなくすため、果実の着色状況に応じて、2回以上に分けて収穫しましょう。

収穫適期を逃して、浮皮果にならないように注意して下さい。

※収穫の目安 ○大津四号 ⇒ 完全着色

○青島温州 ⇒ 8分色以上

果実管理

通常予措：コンテナ8分目ほどに軽く入れて、通気の良い貯蔵庫下屋等で10～15日間乾燥した空気にさらします。総量の5%程度の減量（しおれ）が目安です。（果皮がややしなびて弾力を持つ程度）

高温予措：着色促進と減酸を目的に、収穫直後に20℃で7日間果実を保温しておく。果実の傷からくる腐れが早いので、再度選果をしてから貯蔵・出荷をしましょう。

貯蔵

予措終了後、温度3～5℃・相対湿度85%を目安に貯蔵します。朝夕の換気と定期的に点検で腐敗果を取り除きましょう。また、0℃付近になると低温障害を起こすので、寒波時は貯蔵庫を密閉しましょう。

病害虫防除等 収穫後の12月下旬～1月中旬（厳寒期の散布は避けましょう）

○ミカンハダニ アタックオイル 60倍 1.66 ツル／水 100 ツル 又は

○カイガラムシ類 ハーベストオイル 60倍 1.66 ツル／水 100 ツル又は

スプレー油 60倍 1.66 ツル／水 100 ツル

* 敷布量は10aあたり500～600 ツルを目安に、たっぷり散布しましょう。

（病害虫多発の主な原因是、密植と薬剤のかけムラです。）

—【中晩柑】—

防寒・鳥害対策のため、袋掛けやネット被覆を実施しましょう。園地や品種により差がありますが、1月中旬までには終了するように作業しましょう。

—【お 茶】—

老朽茶園の改植準備

生産性の向上と良質茶の生産をはかるため、老朽茶園を改植することが必要です。

改植は抜根、天地返し、地ならしを計画的に行いましょう。その場合、石灰窒素をあらかじめ 10a あたり 80kg 程度散布し、有機物の腐植化をはかりましょう。

—【水 稲】—

土づくり

水稻が健全に生育するために、「堆肥・ワラ等」の有機物やケイカル等の土壤改良剤を計画的に施し、地力を増進する必要があります。

○有機物の施用

ワラの場合 収穫後年内までに全体に広げ、深耕（15 センチ以上）しておきましょう。

（必要に応じて、石灰窒素（20kg／10a）を 11 月末までにすき込み施用すると腐熟が進む）

完熟堆肥の場合 10 月から 2 月に全体に施し深耕しておきましょう。（500～1,000kg/10a）

○土壤改良剤の施用 ケイカル 100kg／10a 又は ようりん等

雑草防除 冬季にできる水田の雑草防除

冬季に耕耘することにより除草効果を期待することができます。多年生雑草の塊茎や根茎は低温や乾燥に弱いので、冬季の耕起が防除に有効です。特にミズガヤツリ・クログワイ・オモダカなどの多い水田では反転耕により凍結枯死させられるので除草効果が高くなります。耕耘作業は年内までに一度は必ず行いましょう。

スクミリンゴガイ対策

管内でスクミリンゴガイ（別名：ジャンボタニシ）の発生が確認されております。発生した水田では耕耘を行い、貝を傷つけ越冬させないようにしましょう。

農薬を使用する際は、適用作物・希釈倍数・使用回数・使用方法等の使用基準を遵守するとともに飛散防止に努め、ラベルをよく確認し、必ずラベルに基づいて使用しましょう。

＜注意＞

「収穫〇日前」：定められた使用時期。記載されている収穫前日数まで散布ができます。（前日は24時間前）
「回数」：農薬成分の総使用回数のこと。栽培期間中、何回散布可能か確認しましょう。

△△店舗により農薬の在庫状況が異なりますので、記載の農薬を購入される場合は購入先の店舗に事前に在庫確認をしていただくとスムーズに購入できます。△△

水稻栽培講習会の開催について ~来年に向け準備を!~

下記のとおり講習会を開催いたします。ぜひご参加ください。

1. 日時・会場

日付	時間	会場
12月19日(火)	10:00	開成事業所3階 大会議室 (開成町吉田島2000)
	14:00	本店3階 第2・第3会議室 (小田原市鴨宮627)

2. 対象者 JAかながわ西湘管内組合員(水稻栽培者)

3. 内容 (予定 全日程共通)

①来年の栽培に向けて ②病害虫・雑草防除について ③その他

4. 講師 農業技術センター

5. 申込 12/15(金)迄に當農部當農指導課又は最寄りの支店・センターまでお申込み下さい。

※全日程同じ内容ですので、希望する日程にご参加ください。

(お問合せ)

J Aかながわ西湘當農部當農指導課

TEL: 0465-46-6950

JAねっとショップのご案内

令和5年4月より予約回覧注文書のねっとショップへの掲載が始まり、予約注文が可能となりました。

「JAねっとショップ」とは…

組合員様向けのねっとショップサービスであり、スマートフォンやパソコンから肥料・農薬・食品等を注文することができます。会員登録及び利用料は無料です。

~ねっとショップのメリット~

1. 24時間いつでもどこでも注文可能
2. 商品によっては値引の適用
3. 過去の購入履歴が閲覧可能

価格例(令和5年11月現在)

エコレット808(20kg)

通常価格 2,810円 → ねっとショップ価格(自己取) 2,336円

QRコード

新規会員登録はこちらから

<https://jac-toru.zennoh.or.jp/>

又は

