

2024
1月

久野営農経済センターだより



【久野営農経済センター肥料農薬販売会】

開催場所：久野営農経済センター

開催日時：令和6年1月19日(金) 9:00~12:00 雨天決行

当日は、肥料、除草剤を特別価格にて販売させていただきます。

また、仕込み味噌、自動車、農機の展示・相談ご予約等も行っております。

皆様のご来店をお待ちしております。

【メッシュ柵・支柱・結束線をご用意しております。】

メッシュ柵いのししくん 1.2m×2m 1枚 1,650円

支柱鉄筋 1本 570円

ステンレス結束線 1束100本 1,650円

※応援プログラム対象、詳しくはお近くの支店または営農経済センターまでお問合せ下さい。

【温州みかん】*下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

貯蔵管理 室内温度：3~5℃ 湿度：85%程度が最適の環境です。

貯蔵庫内の湿度が高い時は天気の良い日に開放して乾燥した空気を入れ、湿度が低い時は新聞紙でカバーをするか打ち水をして湿度を保ちましょう。

但し、湿度が高すぎると、予措戻りになり浮皮果になるので注意しましょう。また、0℃付近になると低温障害を起こすため、寒波時は貯蔵庫を密閉しましょう。

また、貯蔵庫内への果実の入れすぎに注意し、貯蔵中に発生した腐敗果は適時取り除きましょう。

* 出荷時の家庭選果を徹底してください。

害虫防除 12月下旬~1月中旬(収穫後、厳寒期をさけて散布をしましょう。)

○ミカンハダニ アタックオイル又はハーベストオイル又はスプレーオイル

○カイガラムシ類 60倍 1.66ℓ/水 100ℓ

カイガラムシ類が見られた園地では、必ず実施して下さい。

越冬中の虫や卵を油で被覆して窒息させますので抵抗性がつきません。

土壌改良 酸性土壌の矯正 苦土ソルカル 200kg/10a (1~2月)

* 葉色の悪い園は微量元素不足が考えられるので、マルチサポート 80kg/10a を施用する。

【中晩柑】

防寒対策と鳥害対策を兼ね、袋かけやネットによる被覆を遅くとも1月中旬までには終了させましょう。

電気柵、鉄網柵を園外周に設置する。定期的にメンテナンスする。

【湘南ゴールド】

病害防除 12月下旬~1月下旬 ○貯蔵病害 ベフトップジンフロアブル(劇) 収穫前日 1,500倍 66cc/水 100ℓ 2回

(青かび病、緑かび病、軸腐病) 又は トップジンM水和剤 収穫前日 2,000倍 50g/水 100ℓ 5回

※1月に入りサンサンネット被覆前にベフトップジンを薬剤散布すると、さび症(果皮の褐色)の発生軽減に効果があります。(県農業技術センター試験結果より)

【キウイフルーツ】

整枝剪定 12月～2月上旬（樹液が流動する前）

一文字整枝を基本に、**主枝・亜主枝を明確にし**ながら、養分の無駄づかいになる太い枝を出来るだけ減らすことがポイントになります。ただし、高樹齢樹は樹がいたむので亜主枝の更新は避けましょう。古い側枝（結果母枝）の更新では先追いしないよう亜主枝、主枝に近づける切り戻し剪定を行きましょう。安定した収量を得るため**充実した新梢と本年の結果枝を併用して**、1㎡あたり3～4本の結果母枝を配置しましょう。台風による落葉が多かった園地では、充実した結果母枝を残しましょう。（また、春の風害を想定してやや多めに結果母枝を確保しましょう）

病害虫軽減のポイント

- ・ かいよう病で暗赤色の漏出した場合は、健全部まで切り戻しましょう。
- ・ 軟腐病の発生源になるので果梗は必ず切除しましょう。
- ・ 剪定後の切口へのトップジンMペーストの塗布（かいよう病の侵入口となるため）
（切口が大きければその日のうちに塗布しましょう）
- ・ 病害虫の発生源になる剪定枝は園外廃棄しましょう。

【梅】

病害虫防除 12月～1月上旬

休眠期（落葉後～萌芽前） ○コスカシバ ガットキラー乳剤 休眠期 100倍 2回
樹幹部及び主枝に散布 又は**フェニックスフロアブル 200倍 開花期までに1回 樹幹部及び主枝に散布**
開花前 ○カイガラムシ類・越冬病害虫 石灰硫黄合剤 7倍 14.2リットル/水100リットル

1月 ○**灰星病**

開花期始め(2分咲き)～**満開期**

ベルコート水和剤 収穫30日前 2,000倍 50g/水100リットル 3回

※主力品種の開花始めと満開期に防除しましょう。

※ただし、‘十郎’を栽培している場合は、‘十郎’の開花状況に合わせる

※**灰星病で枯れた枝を開花期まで剪除して、園内に残さない**

整枝剪定 細部(ハサミ)の剪定を1月下旬までには終了させましょう。又、**翌年の事を考えて一年枝は全部取らずに横から出ている弱い枝は残して予備枝の確保を**しましょう。太枝のノコギリ剪定が終了していない園は、芽をいためますので早めに剪定をしましょう。

【レモン】

収穫後かいよう病 IC ボルドー66D 100倍（アピオンE1000倍加用）又はムッシュボルドーDF1000倍（クレフノン200倍加用）発芽前であればアピオンE、クレフノンの加用は必要ない。

貯蔵常温保存は、腐れが多いことから冷蔵保存を基本とする。（気温5℃、湿度85%）

冷蔵できない場合は、**集荷時期に合わせた収穫を行い、貯蔵期間を極力みじかくする。**

農薬を使用する際は、適用作物・希釈倍数・使用回数・使用方法等の使用基準を遵守するとともに飛散防止に努め、ラベルをよく確認し、必ずラベルに基づいて使用しましょう。

【お知らせ】 2023年（令和5年）11月以降、スプラサイド剤が使えません

かんきつのカイガラムシ等の防除で使用されている「スプラサイド乳剤40」など、有効成分「DMTP」を含む農薬は、最終有効年数が2023年10月末までとなっており、11月以降の使用ができません。ご自宅等に保管されているものも使用できないので、ご注意ください。

対象薬剤	スプラサイド乳剤、スプラサイド水和剤、等
有効成分	DMTP
最終有効年数	2023年（令和5年）10月末まで

詳しくは、お近くの営農経済センターまでご連絡ください。