



【果 樹】

縮間伐及び園地環境の改善

高品質果実の生産、低樹高化のためには、十分な樹間距離が必要になります。密植園では、樹高が高くなり作業性が低下し、また日陰になるため高品質果実の生産が出来ません。剪定に入る前に縮間伐をして十分な樹の間隔を確保しましょう。併せて、園地の防風林等の手入れもしましょう。

【温州みかん】

施 肥 1月～2月

○珪タンカル 200kg/10a 酸性土壌の是正が目的です。
* 葉色の悪い園(微量元素不足の可能性あり)では、マルチサポート 80kg/10a を使用

整枝剪定(大津・青島) 2月中旬以降(厳寒期を過ぎた頃)から始めましょう。

大津・青島は大果系です。剪定量が多いと大玉果となります。
中玉果の生産のために隔年で管理方法を変えましょう。

① 表年の樹

ハサミ剪定を主体で主枝の切り下げ、下垂した枝の切返し、密生した夏秋梢の整理、強い夏枝の発生部からの除去等をししましょう。剪定量を増やすと大玉果の原因になります。
剪定量は1割以下を目安とします。

② 裏年の樹(昨年着果が多かった樹)

ノコギリ剪定を主体に樹形を整えましょう。樹形は3本主枝の開心自然形が基本になります。
剪定量が多いと、翌年大玉果が増えますので、剪定量は2割以下を目安とします。

③ 共通

薬剤散布や収穫の作業性向上のため、樹冠内部への入り口を北側に作りましょう。
強い内向枝・病虫害被害枝・枯れ枝は除去しましょう。

【湘南ゴールド】

収穫

12月以降3月にかけて糖度は上昇し、クエン酸濃度は低下する。外観にとらわれず、食味を確認してから収穫するが、凍害が心配される場合や地域では早めの収穫をすることもあります

貯蔵

貯蔵は貯蔵箱やコンテナを使用してから行う。湿度保持のため数枚の新聞紙で覆う。
コンテナを使用する場合は七分目の入庫量とし4～5段積みにて不織布で覆う。
この時期の貯蔵庫は入庫量が少ないので湿度保持に努める。

【レモン】

施肥 1月～2月

○苦土タンカル 200kg/10a 土壌酸度を適正に保つ。

【キウイフルーツ】*下線が引いてあるものは重要防除です。

病虫害防除 3月中旬(発芽前)

○かいよう病 ICポルドー66D 50倍 2,000g/水100ℓ
○キウイヒメヨコバイ アグロスリン乳剤 収穫7日前 2,000倍 50ml/水100ℓ

剪 定

剪定が終了していない園は、すみやかに剪定を終わらせましょう。

【う め】

病虫害防除 *下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょう。

1月

○灰星病(開花2部咲き期～満開期) ヘルコート水和剤 収穫30日前 3回 2,000倍 50g/水100ℓ
※ 灰星病の罹病枝が分からない方は、最寄りの営農経済センターにご確認ください。また、十郎を栽培している場合は、十郎の開花状況に合わせてみましょう。

※ 灰星病で枯れた枝は開花期までに剪除して、園内に残さないことが重要です。

3月上旬～3月下旬

○かいよう病 コサイド3000 硬核期まで 2,000倍 50g/水100ℓ
(薬害軽減のためクレフノン200倍 500g/水100ℓを加用する)

3月中旬～3月下旬

○アブラムシ類 スミチオン乳剤 収穫14日前 2回 2,000倍 50ml/水100ℓ 又は
チェス顆粒水和剤 収穫21日前 2回 5,000倍 20g/水100ℓ

○灰色かび病・黒星病 ポリバリン水和剤 収穫30日前 3回 1,000倍 100g/水100ℓ

※ 適期は落弁期(花びらの80%が散った時期)であるが品種により開花時期が異なるので状態に合わせて散布しましょう。

【か き】

施 肥 2月

○柿配合 100kg/10a

病虫害防除

○ヒメコスカシバ 幼虫の生息場所をなくすため、粗皮削りを行いましょう。特に太い枝の分岐部は重点的に削りましょう。

※ 越冬病虫害、樹幹害虫は荒皮削り以外にも耕種的防除(落葉、枝などの園外廃棄)を行うと防除効果が高いです。

※ スカシバ類多発園では開花期までにフェニックスフロアブル(開花期まで200倍1回500ml/100ℓ)主幹部及び主枝に散布する。粗皮を剥いで処理すると効果的である。

※ 特に伊豆早生は被害を受けやすいため発生に注意しましょう。

整枝剪定 2月末までには終了しましょう。

樹形は開心自然形が基本になります。主枝3本を理想とし、低樹高化に取り組みましょう。
柿は昨年発生した枝の先2～3芽から出た新梢に花をつけますので、枝の先端は切り返しをせずに切り戻し剪定を心掛け、主枝・亜主枝の近くに、30～50cm毎に充実した結果母枝を配置していきます。

【お 茶】

整 枝 3月中旬(寒害がなくなるころ)

秋整枝をしていない園では、摘採面を揃えるため浅く整枝しましょう。
秋整枝をした園で、遅れ芽や立ち葉が出ている園では再整枝(化粧ならし)をしましょう。
※再整枝の目的は1番茶の品質低下防止です。ごく浅く整枝しましょう。深刈りは減収につながります。

施 肥 施肥の前に敷き藁・敷き草等をよけておきましょう。

春肥は、一番茶の芽の生育と品質に効果があり、茶樹はこの時期に平均温度が10℃以上になると根が動き始めて、樹体内の養分の転流が始まります。

分肥(2回に分ける)土と混和させると肥効が高まります。

2月下旬 足柄茶配合 O33 3袋/10a 3月中旬に足柄茶配合 2袋/10aを1回ずつ施肥しましょう。

【水 稲】

冬季耕うん 12月、1月に行っていない方は直ちに行いましょう。

冬季耕うんの主な目的は①～④となります。1～2回を目安に冬季耕うんをしましょう。

- ① 刈り株・ワラを分解します。*田植え直前（春）にすき込むと病害虫が発生しやすくなります。
- ② 病害虫の越冬場所になりやすい「ひこばえ」を除去します。（害虫を越冬させない）
- ③ 雑草の発生を抑えます。
草種により効果が異なりますが、多年生雑草の塊茎・種子を乾燥により減少させます。
*セリは春に耕うんすると、増えてしまいます。
- ④ 水稻除草剤の効果を安定させます。（田面が平らでないと効果が弱まります。）

スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）対策

ジャンボタニシ発生水田では、寒期にロータリー耕を行い貝を掘り起こし寒気にさらすとともに破碎します。作業速度を遅くしロータリーの回転数を高く浅めに耕うんすると効果が高まります。

【ジャガイモ】

2月中旬～3月上旬

畑の準備

○馬鈴薯専用配合 052 10kg/a 重焼リン 2kg/a 植付けの半月前までに全面施用し混和しておく

種イモの準備と植付け

植付け前に、一片40～50gの大きさに切り、それぞれに芽がいくつつかっていることを確認し、芽が集まっている頂部を切る。切った後2～3日程陰干しし切り口を乾かす

種イモ量の目安：15～16kg/a

そうか病 アグリマイシン-100 40～100倍

植付前 1回 5～10秒間種いも 浸漬

ネビジン粉剤 6kg/a 植付時 1回 全面土壌混和

○種イモの黒あざ病による腐敗防止 ベンレート水和剤

種イモ重量の0.3～0.4%をまぶすと良い（例） 3～4g/種イモ 1kg

幅60㍍程の畝に深さ7～8㍍の溝を作り、種イモの切り口を下にして30㍍間隔に植付ける

※気温が高くなる場合には、種イモの萌芽が進みやすくなります。種イモは通気性の良い容器に移し替え呼吸熱がこもらないようにし、温度2～3℃の暗所で保管しましょう。また、種イモの呼吸量が増加すると黒色心腐が発生しやすくなります。発生防止のため温度管理を徹底し高温を避け、換気を十分に行いましょう。

※ 網掛けの農薬につきましては医薬用外劇物となりますので、購入の際には印鑑が必要となります。

令和5年産 湘南潮彩レモン初出荷!!

令和5年12月、「湘南潮彩レモン」を約2トン集荷いたしました!!

湘南潮彩レモンは、当JAオリジナルブランドとして名称・ロゴマークを商標登録しており、業者や市場から多く要望されています。

「湘南潮彩レモン」は令和6年5月までの集荷となりますのでレモンを栽培されている方は、ぜひJAへの出荷をご検討ください!

お問い合わせは、最寄りの営農経済センターまでご連絡ください。

農業機械利用事業講習会の開催について

1. 開催場所

開催日時 令和6年3月2日（土）8：30～11：30

開催場所 JA かながわ西湘 開成事業所（開成営農経済センター）

足柄上郡開成町吉田島 2000

2. 申込資格

JA 管内の正組合員及びその家族

3. 申込方法

最寄りの支店及び営農経済センター

4. 申込期日

令和6年2月16日（金）まで