

しょうが(根しょうが)

(ショウガ科)

【令和6年1月1日現在の農薬登録内容】2024版

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
根茎腐敗病	ユニフォーム粒剤		1.8kg/a	30日	3回	定植前作条土壤混和又は生育期土壤表面散布
	ランマンフロアブル		500~1000倍 2~3L/m ²	生育期但し 収穫30日前 まで	3回	治療剤 土壤灌注
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤		2kg/a	植付前	1回	全面土壤混和
薬 剤 散 布						
紋枯病	ダコニール1000		1000倍	14日	5回	予防剤
	モンカットフロアブル40		2000倍	3日	6回	治療剤
アズキノメイガ	パダンSG水溶剤	劇	1500倍	7日	5回	
アワノメイガ						

はくさい

(アブラナ科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5		400g/a	播種時 又は定植時	1回	全面土壤混和又は 作条土壤混和
根こぶ病	ネビジン粉剤		2~3kg/a	播種 又は定植前	1回	全面土壤混和
アオムシ・コナガ・ ヨトウムシ・ ハイマダラノメイガ	プレバソフロアブル5		100倍	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注 セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1 冊(約30×60cm、使用 土壤約1.5~4L)当り 0.5L
薬 剤 散 布						
軟腐病	Zボルドー		500~1000倍	—	—	予防剤
	アグリマイシンー100		1500~3000倍	14日	3回	治療剤
べと病	ダコニール1000		1000倍	7日	2回	予防剤
	ランマンフロアブル		2000倍	3日	4回	治療剤
	リドミルゴールドMZ		1000倍	30日	1回	予防+治療剤
ヨトウムシ	アフアーム乳剤		1000~2000倍	7日	3回	
	プレオフロアブル		1000倍	7日	2回	
コナガ	アニキ乳剤		1000~2000倍	3日	3回	
	プレオフロアブル		1000倍	7日	2回	
コナガ・ヨトウムシ	プレバソフロアブル5		2000倍	前日	3回	

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」