

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
<b>土 壌 施 用</b>						
アブラムシ類	スタークル粒剤		1g/株	定植時	1回	植穴土壌混和
	ベストガード粒剤		1~2g/株	定植時	1回	植穴処理土壌混和
コナジラミ類	スタークル粒剤		1~2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和
<b>薬 剤 散 布</b>						
疫病	ダコニール1000		1000倍	前日	4回	予防剤
	リドミルゴールドMZ		1000倍	前日	2回	予防+治療剤
	プロポーズ顆粒水和剤		1000~1500倍	前日	3回	予防+治療剤
灰色かび病	ファンタジスタ顆粒水和剤		2000~3000倍	前日	3回	治療剤
葉かび病	ダコニール1000		1000倍	前日	4回	予防剤
	トリフミン水和剤		3000~5000倍	前日	5回	治療剤
	ベルコートフロアブル		2000~4000倍	前日	3回	治療剤
アブラムシ類・コナジラミ類	モスピラン顆粒水溶剤	劇	2000倍	前日	3回	
	チェス顆粒水和剤		5000倍	前日	3回	
コナジラミ類	アニキ乳剤		1000~2000倍	前日	3回	
アザミウマ類・ハモグリバエ類	ディアナSC		2500~5000倍	前日	2回	
オオタバコガ	アニキ乳剤		2000倍	前日	3回	
	プレオフロアブル		1000倍	前日	2回	
	プレバソンフロアブル5		2000倍	前日	3回	

※プロポーズ顆粒水和剤はダコニール1000と同成分を含む混合剤のため、総使用回数に注意する。

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」