

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
根こぶ病	ネビジン粉剤		2~3kg/a	播種又は定植前	2回	全面土壌混和
アブラムシ類・コナガ・アオムシ	モスピラン粒剤		0.5~1g/株	定植前日~定植当日	1回	株元散布
ハスモンヨトウ・ハイマダラノメイガ			0.5g/株			
アブラムシ類	スタークル粒剤		2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和
コナガ・アオムシ			2~3g/株			
ハイマダラノメイガ			3g/株			
アオムシ・コナガ・ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5		100倍	育苗期後半~定植当日	1回	灌注 セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り0.5L
薬 剤 散 布						
菌核病	ファンタジスタ顆粒水和剤		2000~3000倍	3日	3回	治療剤
黒腐病	カスミンボルドー		1000倍	7日	4回	予防+治療剤
べと病	ダコニール1000		1000倍	14日	2回	予防剤
	リドミルゴールドMZ		1000倍	30日	3回	予防+治療剤
アオムシ・コナガ・ヨトウムシ	コテツフロアブル	劇	2000倍	前日	2回	
	ディアナSC		2500~5000倍	前日	2回	
	プレオフロアブル		1000倍	7日	2回	
	プレバソンフロアブル5		2000倍	前日	3回	
アブラムシ類	アクタラ顆粒水溶剤		2000~3000倍	3日	3回	

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」