

葉しょうが

(ショウガ科)

【令和6年1月1日現在の農薬登録内容】2024版

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
根茎腐敗病	ユニフォーム粒剤		1.8kg/a	21日	3回	土壌表面散布
	ランマンフロアブル		500～1000倍 3L/㎡	生育期但し 収穫3日前 まで	3回	治療剤 土壌灌注
薬 剤 散 布						
紋枯病	モンカットフロアブル40		2000倍	3日	4回	治療剤

馬鈴薯 (ジャガイモ)

(ナス科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
種 子 消 毒 等						
そうか病	アグリマイシンー100		40～100倍	植付前	1回	5～10秒間種いも浸漬
土 壌 施 用						
そうか病	ネビジン粉剤		6kg/a	植付時	1回	全面土壌混和
薬 剤 散 布						
疫病・ 夏疫病	ダコニール1000		疫病 500～1000倍	7日	5回	予防剤
			夏疫病 1000倍			
	アミスター20フロアブル		3000～4000倍	7日	3回	治療剤
	プロポーズ顆粒水和剤		750～1000倍	7日	5回	予防+治療剤
アブラムシ類	アディオン乳剤		2000～3000倍	14日	4回	
	モスピラン顆粒水溶剤	劇	2000～6000倍	7日	3回	
テントウムシダマシ類	アディオン乳剤		2000～3000倍	14日	4回	
	モスピラン顆粒水溶剤	劇	2000～4000倍	7日	3回	
ジャガイモガ若齢幼虫	パダンSG水溶剤	劇	1500倍	7日	6回	

※プロポーズ顆粒水和剤はダコニール1000と同成分を含む混合剤のため、総使用回数に注意する。

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」