

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
<b>土 壌 施 用</b>						
アブラムシ類	モスピラン粒剤		1g/株	定植時	1回	植穴土壌混和
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤		2kg/a	定植前	1回	全面土壌混和
<b>薬 剤 散 布</b>						
べと病	ジマンダイセン水和剤		600倍	21日	2回	予防剤
	ダコニール1000		1000倍	7日	3回	予防剤
	ストロビーフロアブル		3000倍	前日	3回	治療剤
疫病	ジマンダイセン水和剤		600倍	21日	2回	予防剤
	フオリオゴールド		1000倍	7日	3回	予防+治療剤
うどんこ病	パンチョTF顆粒水和剤		2000倍	前日	2回	治療剤
	トリフミン水和剤		3000~5000倍	前日	5回	治療剤
	ベルコート水和剤		1000~2000倍	7日	4回	治療剤
アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤		2000倍	前日	2回	
	アディオオン乳剤		2000~3000倍	前日	5回	
コナジラミ類	サンマイトフロアブル	劇	1000~1500倍	3日	2回	

※パンチョTF顆粒水和剤はトリフミンと同成分を含む混合剤のため、パンチョTF顆粒水和剤を使用した場合はトリフミンの使用回数を減らす。

甘藷 (サツマイモ) (ヒルガオ科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
<b>種 子 消 毒 等</b>						
黒斑病	ベンレートT水和剤20		20倍	植付前	1回	1分間さし苗基部浸漬 予防+治療剤
<b>土 壌 施 用</b>						
コガネムシ類幼虫	ダイアジノンSLゾル		25倍	植付前	1回	全面土壌混和
	フォース粒剤	劇	900g/a	植付前	1回	全面土壌混和又は 作条土壌混和
ハリガネムシ類						
<b>薬 剤 散 布</b>						
基腐病	トリフミン水和剤		2000~3000倍	前日	2回	
ハスモンヨトウ	コテツフロアブル	劇	2000倍	前日	2回	
	アフーム乳剤		1000~2000倍	7日	3回	
	プレバソンフロアブル5		2000~4000倍	前日	3回	

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」