

| 病害虫名 | 農薬名 | 区分 | 使用濃度 | 収穫前日数 | 使用回数 | 備考 |
|--------------|-------------|----|----------|----------------------|------|------------------------------|
| 種子消毒等 | | | | | | |
| 乾腐病 | ベンレート水和剤 | | 50~100倍 | 植付前 | 1回 | 種イモの芽基部に散布 |
| 土壌施用 | | | | | | |
| 根腐病 | ユニフォーム粒剤 | | 900g/a | 植付時 | 1回 | 植溝土壌混和 |
| 白絹病 | リブレックス水和剤 | | 1000倍 | 30日 | 3回 | 治療剤 株元灌注3L/m ² |
| 薬剤散布 | | | | | | |
| 腐敗病・葉枯病 | Zポルドー | | 500~800倍 | - | - | 予防剤 |
| | アグリマイシン-100 | | 1000倍 | 30日 | 6回 | 治療剤 |
| ハスモンヨトウ | ゼンターリ顆粒水和剤 | | 1000倍 | 発生初期 但し収穫前日 まで | - | |

さといも (サトイモ科)

| 病害虫名 | 農薬名 | 区分 | 使用濃度 | 収穫前日数 | 使用回数 | 備考 |
|--------------|-------------|----|--------------------|-----------------|------|----------|
| 種子消毒等 | | | | | | |
| 黒斑病 | ベンレートT水和剤20 | | 20倍 | 植付前 | 1回 | 1分間種いも浸漬 |
| | | | 種いも重量の 0.4~0.5% | 植付前 | 1回 | 種いも粉衣 |
| 土壌施用 | | | | | | |
| コガネムシ類幼虫 | ダイアジノンSLゾル | | 25~50倍 | 植付前 | 1回 | 全面土壌混和 |
| | オンコル粒剤5 | | 600~900g/a | 生育期但し 収穫60日前 | 1回 | 株元土壌混和 |
| 薬剤散布 | | | | | | |
| ハスモンヨトウ | プレオフロアブル | | 1000~2000倍 | 7日 | 2回 | |
| | プレバソンフロアブル5 | | 2000倍 | 前日 | 3回 | |
| アブラムシ類 | アディオソ乳剤 | | 3000倍 | 7日 | 5回 | |

さやいんげん (マメ科)

| 病害虫名 | 農薬名 | 区分 | 使用濃度 | 収穫前日数 | 使用回数 | 備考 |
|-------------|--------------|----|----------------------|--------------|------|--------|
| 土壌施用 | | | | | | |
| アブラムシ類 | アドマイヤー1粒剤 | | 1~2g/株 但し600g/aまで | 播種時又は 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 |
| 薬剤散布 | | | | | | |
| 菌核病 | セイビアーフロアブル20 | | 1000~1500倍 | 前日 | 3回 | 予防剤 |
| ハダニ類 | ダニトロンフロアブル | | 1000~2000倍 | 前日 | 1回 | |
| アブラムシ類 | モスピラン顆粒水溶剤 | 劇 | 2000~4000倍 | 前日 | 3回 | |
| | アクタラ顆粒水溶剤 | | 3000倍 | 前日 | 3回 | |
| ハモグリバエ類 | アフーム乳剤 | | 2000倍 | 前日 | 2回 | |
| | プレバソンフロアブル5 | | 2000倍 | 前日 | 3回 | |

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」