

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
キスジノミハムシ	フォース粒剤	劇	400g/a	播種時	1回	播溝土壌混和
薬 剤 散 布						
白さび病	ランマンフロアブル		2000倍	3日	3回	治療剤
	アミスター20フロアブル		2000倍	7日	2回	治療剤
コナガ	コテツフロアブル	劇	2000倍	前日	2回	
	フェニックス顆粒水和剤		2000～4000倍	前日	2回	
キスジノミハムシ	スタークル顆粒水溶剤		2000倍	3日	2回	
ハモグリバエ類	スピノエース顆粒水和剤		5000倍	前日	3回	
ハイマダラノメイガ	フェニックス顆粒水和剤		2000～4000倍	前日	2回	
アオムシ	エスマルクDF		1000～2000倍	発生初期 但し収穫前日 まで	—	
アブラムシ類	ダントツ水溶剤		2000～4000倍	3日	3回	

ごぼう (キク科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
黒あざ病	リゾレックス粉剤		4kg/a	播種前	1回	全面土壌混和
ネグサレセンチュウ・ ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤		2kg/a	播種前	1回	播種溝土壌混和
薬 剤 散 布						
うどんこ病	ジーファイン水和剤		750～1000倍	前日	—	予防+治療剤
	トリフミン水和剤		1000倍	前日	3回	治療剤
アブラムシ類	アディオン乳剤		2000～3000倍	7日	5回	

こまつな (アブラナ科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
根こぶ病	フロンサイド粉剤		3kg/a	播種前	1回	全面土壌混和
キスジノミハムシ	フォース粒剤	劇	400g/a	播種前	1回	全面土壌混和
薬 剤 散 布						
白さび病	ランマンフロアブル		2000倍	3日	3回	治療剤
	アミスター20フロアブル		2000倍	7日	2回	治療剤
アブラムシ類	ウララDF		4000倍	前日	2回	
	アグロスリン乳剤	劇	2000倍	前日	2回	
ハクサイダニ	コテツフロアブル	劇	2000倍	3日	1回	
コナガ	フェニックス顆粒水和剤		2000～4000倍	前日	2回	
	アクセルフロアブル		1000倍	前日	3回	

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」