

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
タネバエ	ダイアジノン粒剤5		300~500g/a	播種時又は定植時	2回	作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土
薬 剤 散 布						
べと病	ダコニール1000		1000倍	7日	6回	予防剤
	プロポーズ顆粒水和剤		1000倍	7日	3回	予防+治療剤
白色疫病						
べと病	リドミルゴールドMZ		500~1000倍	7日	3回	予防+治療剤
白色疫病						
灰色かび病	セイビアーフロアブル20		1000~1500倍	前日	3回	予防剤
	ファンタジスタ顆粒水和剤		2000~4000倍	前日	5回	治療剤
小菌核病	セイビアーフロアブル20		1500倍	前日	3回	予防剤
	ファンタジスタ顆粒水和剤		2000~4000倍	前日	5回	治療剤
軟腐病	アグリマイシン-100		1000倍	7日	5回	治療剤
アブラムシ類	マラソン乳剤		2000~3000倍	7日	6回	
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	劇	2000倍	7日	3回	

※プロポーズ顆粒水和剤はダコニール1000と同成分を含む混合剤のため、総使用回数に注意する。

チンゲンサイ (アブラナ科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
根こぶ病	ネビジン粉剤		2~3kg/a	播種又は定植前	1回	全面土壌混和
キスジノミハムシ	ダイアジノン粒剤5		600g/a	播種時	1回	全面土壌混和
ネキリムシ類		播種時又は定植時				
薬 剤 散 布						
白さび病	ランマンフロアブル		2000倍	3日	3回	治療剤
軟腐病	スターナ水和剤		1000倍	7日	2回	治療剤
キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	劇	4000倍	7日	1回	
アブラムシ類						
	アグロスリン乳剤	劇	2000倍	前日	2回	
コナガ	コテツフロアブル	劇	2000倍	7日	1回	
	アフーム乳剤		1000~2000倍	3日	3回	

とうもろこし(未成熟) (イネ科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5		600g/a	出芽時	1回	土壌表面散布
薬 剤 散 布						
アワノメイガ	デナポン粒剤5		400~600g/a	雄穂抽出期~雌穂抽出期 但し収穫21日前まで	2回	
	フェニックス顆粒水和剤		2000~4000倍	前日	2回	
	スミチオン乳剤		1000倍	7日	4回	
アブラムシ類	アグロスリン乳剤	劇	1000~2000倍	7日	3回	
	モスピラン顆粒水溶剤	劇	2000~4000倍	前日	3回	
オオタバコガ・ヨトウムシ	アフーム乳剤		1000~2000倍	3日	2回	

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」