

| 病害虫名 | 農薬名 | 区分 | 使用濃度 | 収穫前日数 | 使用回数 | 備考 |
|---------------------------|--------------|----|---------------|--------------------------|------|----------------------------|
| 土 壌 施 用 | | | | | | |
| アブラムシ類 | モスピラン粒剤 | | 300g/a | 播種時 | 1回 | 播溝土壌混和 |
| キスジノミハムシ | フォース粒剤 | 劇 | 400～900g/a | 播種時 | 1回 | 播溝土壌混和 |
| | | | 600～900g/a | 播種時 | 1回 | 全面土壌混和 |
| | ダイアジノン粒剤5 | | 600g/a | 播種時および生育期、 但し収穫21日前まで | 2回 | 播種時：作条土壌混和 作物生育中：株元土壌混和 |
| タネバエ | フォース粒剤 | 劇 | 400g/a | 播種時 | 1回 | 播溝土壌混和 |
| | ダイアジノン粒剤5 | | 400～600g/a | 播種時 | 1回 | 全面土壌混和または 作条土壌混和 |
| ネキリムシ類 | | | 600g/a | 生育期、但し 収穫21日前まで | 1回 | 土壌表面散布 |
| ネグサレセンチュウ | ネマトリンエース粒剤 | | 1.5kg～2.5kg/a | 播種前 | 1回 | 全面土壌混和 |
| 薬 剤 散 布 | | | | | | |
| 白さび病・わかか症 | アミスター20フロアブル | | 2000倍 | 14日 | 3回 | 治療剤 |
| | ランマンフロアブル | | 2000倍 | 3日 | 3回 | 治療剤 |
| 黒斑細菌病・軟腐病 | カッパーシン水和剤 | | 1000倍 | 14日 | 3回 | 予防+治療剤 |
| | カセット水和剤 | | 1000倍 | 14日 | 3回 | 治療剤 |
| アブラムシ類 | ウララDF | | 2000倍 | 前日 | 2回 | |
| | ベストガード水溶剤 | | 1000～2000倍 | 7日 | 3回 | |
| ハイマダラノメイガ (ダイコンシンクイムシ) | アニキ乳剤 | | 1000～2000倍 | 3日 | 3回 | |
| | フェニックス顆粒水和剤 | | 2000～4000倍 | 7日 | 2回 | |
| コナガ | アフアーム乳剤 | | 1000～2000倍 | 7日 | 3回 | |
| | コテツフロアブル | 劇 | 2000倍 | 14日 | 2回 | |
| ヨトウムシ | プレバソンフロアブル5 | | 2000倍 | 前日 | 3回 | |

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」