

2024
3月

久野営農経済センターだより①



久野営農経済センター営業時間について

3月29日(金) 8:40~12:00まで。以降は決算棚卸のため休業となります。

3月30日(土)~31日(日) 統括センター再編移行作業のため休業となります。

4月1日(月) 午前休業、12:00より営業となります。

大変ご不便をお掛け致しますが組合員をはじめご利用者皆様のご理解、ご協力を賜ります様
お願い申し上げます。

【温州みかん】

施肥 3月中下旬 ○特選みかん配合 655 160kg/10a 施肥後、軽く中耕を行いましょう。
※特選みかん配合 655 には 微量要素 が含まれています。数年に一度は微量要素欠乏対策の為、特選みかん配合 655 を使用しましょう。

石灰資材の施用 ○顆粒タイニー 又は 苦土タンカル 200kg/10a
石灰資材をここ数年施肥していない園(又は、1~2月に石灰資材を施用していない園)では、根の活動が低下し、養分の欠乏をひきおこす可能性があるため必ず施用し中耕しましょう。
尚、春肥とは最低でも2週間以上あけてください。

病虫害防除 3月中下旬 ○かいよう病・そうか病対策
病斑のある枝葉は、新葉が出てくるときに感染源となるので、剪定時に取り除いて園内から持ち出し病原菌の密度を低くしましょう。

○かいよう病 コサイド 3000 1,000倍 100g/100ℓ (クレフノン 200倍 500g/水 100ℓ加用)
※マシン油乳剤と混用散布は避け、近接散布は最低2週間以上あけましょう。
※温州みかん園に中晩柑類(ネーブル・レモン等)が混植されている場合には防除を必ず行いましょう。
※この時期に散布できなかった園は4月上中旬にコサイド 3000 2000倍 50g/水 100ℓ (クレフノン 200倍 500g/水 100ℓ加用) 又はイデグリーン水和剤 500倍 200g/水ℓ (クレフノン 200倍 500g/水 100ℓ加用) を散布しましょう。

【中晩柑】

不知火・はるみの剪定

主枝先端を明確にして、直径1cmぐらいのところを切り返し、予備枝(坊主枝)を作り、新梢を発生させ樹勢の維持を行います。翌年の結果母枝の確保のため、鉛筆位の太さの予備枝(坊主枝)を、亜主枝に対して1本設けましょう。はるみは主枝先端部の切り返しを強めに行い、不知火はやや強めの切り返しにとどめる。はるみ程強く切り返す必要はない。

施肥 特選みかん配合 655 140kg/10a 施肥後に軽い中耕を行う。

病虫害防除 はるみ・レモン・ネーブル等は、かいよう病に罹病しやすいので湘南ゴールドの項を参照に防除して下さい。

『デコポン』の名称について

デコポンの名称は、熊本県果実連の登録商標です。「不知火」の果実は糖酸度に関係なく個人販売、JA直売所において『デコポン』の名称で販売できません。

【レモン】

整枝剪定

特に若木は樹勢が強く花芽が付きにくいので、樹勢が落ち着くまでの整枝剪定は、整枝を主体とし、徒長枝や混み合う枝の間引きを軽く行う程度とする。また、花芽が着く春枝の先端は切り返さない。枝は立ち性で太く放置すると高くなるので、枝を下げ誘引する。

樹勢が落ち着いてきたら、徐々に剪定量を増やし、開心自然形にしていくが、樹勢が強い場合、過度の剪定は徒長枝が多発し結果しなくなるので注意が必要です。樹幹内の枯れ枝は黒点病防除のため、常に除去するように心がける。

春肥施用 (3月中旬頃) 特選みかん配合 160kg/10a 施肥後、軽く中耕を行う。

【湘南ゴールド】

選果

湘南ゴールド 階級	2S	S	M	L	2L
横径 (mm)	40~45	46~50	51~55	56~61	62~67
温州みかん 規格	4S	3S	2S	S	M

*規格板は営農経済センターで取り扱い中です

剪定

温州みかんと同じ開心自然型とします。しかし、温州みかん同様の剪定では強すぎるため、主枝や亜主枝を竹などで開張し、逆行枝、側枝の重なり枝の間引き剪定と下垂枝の切り返し程度に控え、樹冠内部に光が入る様にしましょう。

結実し始めた樹は弱剪定で樹形が乱れているので、剪定量を増やし樹形を徐々に改善しましょう。

施肥 3月中下旬

特選みかん配合 655 140 kg/10a 施肥後に軽い中耕を行う。

収穫後

〇かいよう病

ICボルドー66D 100倍 1,000ml/100畝 (アピオンE 1,000倍 100ml/100畝加用)
又は

ムッシュボルドーDF 1,000倍 100g/100畝 (クレフノン 200倍 500g/100畝加用)
発芽前であればアピオンE、クレフノンの加用はない。

※病斑のついた枝は剪定時に園外へ持ち出す。ICボルドー66Dはマシン油との散布間隔は14日

【キウイフルーツ】 *下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。

施肥 3月中旬

〇キウイフルーツ配合 654 100kg/10a (新梢の充実と初期肥大促進を目的)

病害虫防除 3月上旬 (剪定後)

〇カイガラムシ類 スプレーオイル 100倍 混用
アプロード水和剤 収穫前日 2回 1,000倍 100g/水 100畝

3月中旬 (発芽前)

〇キウイヒメヨコバイ アグロスリン乳剤 (劇) 収穫7日前 3回 2,000倍 50ml/水 100畝

〇かいよう病 ICボルドー66D 収穫後~発芽前 50倍 2畝/水 100畝

※キウイヒメヨコバイの多発園ではこの時期防除することにより発生を減らすことができます

2024
3月

久野営農経済センターだより②

【梅】*下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょ。う。

施肥 3月中旬

○梅配合 80kg/10a (樹勢を安定させ着果後の肥大促進を目的)

病害虫防除 3月上旬～3月下旬

○かいよう病 コサイド3000 2,000倍 硬核期まで 50g/100株
(クレフノン 200倍 500g/100株加用)

※この時期のかいよう病防除は重要防除になります。必ず散布し、加工果実を減らしましょう。

3月中旬～下旬○アブラムシ類 スミチオン乳剤 収穫14日前 2回 2,000倍 50ml/水100株

又はチェス顆粒水和剤 収穫21日前 2回 5,000倍 20g/水100株

○灰色かび病・黒星病 ポリベリン水和剤 収穫30日前 3回 1,000倍 100ml/100株

※灰色かび病の防除適期は落弁期(花びらの80%が散った時期)であるが品種によって開花時期が異なるので状態に合わせて防除する。

<黒星病の防除について>

黒星病の発生が非常に多くなっています! 4月上旬、下旬、5月上旬の春先の防除が有効になりますので徹底しましょう! 特に、5月上旬の防除をされていない園は、4月の防除に加え今年は必ず防除をするようにしましょう!

4月上旬 ベルクート水和剤 収穫30日前 3回 2,000倍 50g/水100株

4月下旬 ストロビードライフフロアブル 収穫7日前 3回 3,000倍 33g/水100株

5月上旬 スコア顆粒水和剤 収穫前日 3回 3,000倍 33g/水100株

*2週間間隔で散布しましょう。

*前年の被害枝は切除しましょう。

【お茶】

施肥

2月下旬 ○足柄茶配合033 3袋/10a

3月中旬 ○足柄茶配合033 2袋/10a

病害虫防除 3月上～中旬 ○カンザワハダニ バロックフロアブル 摘採14日前 1回 3,000倍(33ml/水100株) 又はダニゲッターフロアブル 摘採7日前 1回 2,000倍(50ml/水100株)

○もち病 ドイツポルドーA 摘採14日前 500倍(200g/水100株)

4月上中旬○ツマグロアオカスミカメ多発園 キラップフロアブル 摘採7日前 1回 2,000倍(50ml/水100株)

【ジャガイモ】

芽かき 地上部に出た芽が10ヶ程度に伸びたら、太い茎を2本残し他の茎を根元から取る。(特に春作)

追肥・土寄せ 芽かき後、NK化成1kg/aを施し、株元に5ヶ程土寄せする。半月後にもう一度NK化成2kg/aと土寄せを行う。

※ジャガイモは種イモより上にできるので、イモに日光が当たり緑化しないようにしましょう。

※ただし、生育初期から多くの土を寄せると新しいもの生育が遅れる。

農業を使用する際は、適用作物・希釈倍数・使用回数・使用方法等の使用基準を遵守するとともに飛散防止に努め、ラベルをよく確認し、必ずラベルに基づいて使用しましょう。

<冬季のスクリミングガイ（ジャンボタニシ）の被害防止の徹底について>

今年は暖冬傾向にあり、スクリミングガイの冬期における越冬個体数の増加及び春期における被害が懸念されます。冬期の防除をしっかりと行い、スクリミングガイの被害防止・軽減をしましょう！

① 冬期の耕うん

厳寒期前にトラクターの走行速度を遅く、ロータリーの回転を速く、土壌を細かく砕くように耕うんすることで貝を物理的に破壊するとともに寒風にさらしましょう。効果を高めるために水分が少なく土壌が硬いときに耕うんをしましょう。

※本貝を別の圃場に持ち込むことを防ぐために、使用後のトラクターの爪等についた泥はよく洗浄しましょう。

② 水路の泥上げ

水路に堆積した泥の掘り上げや雑草の除去を地区全体で行い、泥を薄く延ばして寒風にさらす、見つけてつぶすなどして確実に殺貝しましょう。また、泥上げや雑草の除去で越冬場所や翌年の餌をなくすことができます。

令和5年産湘南潮彩レモン 集荷状況

令和6年1月「湘南潮彩レモン」を約5トン集荷いたしました！！

湘南潮彩レモンは、当JAオリジナルブランドとして名称ロゴマークを商標登録しており、業者や市場から多く要望されています。

「湘南潮彩レモン」は令和6年5月まで集荷しておりますのでレモンを栽培している方は是非JAへのご出荷をご検討ください！！

お問い合わせはお近くの営農経済センターまでお問い合わせください。