

# 茶

【令和6年1月1日現在の農薬登録内容】2024版

※ 太枠は重要防除です。

## 主要防除

月	対象病害虫(時期)	区分	使用農薬	希釈倍率	摘採前日数	使用回数	管理補足
3月上旬～4月上旬	カンザワハダニ		パロックフロアブル	3000倍	14日	1回以内	
	もち病		ドイツボルドーA	500倍	14日	-	
7月中～下旬	チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ チャトゲコナジラミ		コルト顆粒水和剤	3000倍	7日	2回以内	* 夏整枝後、2週間を目安に散布する。
8月上～中旬	チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ チャノホソガ チャハマキ チャノコカクモンハマキ	劇	ロディー乳剤	1000倍	7日	1回以内	* 前回防除から、2週間後を目安に散布する。
	炭疽病		オンリーワンフロアブル	3000倍	7日	2回以内	
11月(秋整枝後)	カンザワハダニ チャトゲコナジラミ		アタックオイル	100倍	-	-	

## 補完防除

4月上中旬	ツマグロアオカミカメ		キラップフロアブル	2000倍	7日	1回以内	萌芽期～開葉期に散布する。
二番茶摘採園 6月上中旬	チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ チャトゲコナジラミ	劇	コテツフロアブル	2000倍	7日	2回以内	* チャトゲコナジラミも対象とする場合は6月上旬に散布する。 * チャノホソガの多発が予想される時は「カスケード乳剤」4000倍を代用する。
	もち病・炭疽病		オンリーワンフロアブル	3000倍	7日	2回以内	
6月下旬～7月上旬	輪班病 新梢枯死症		カスミンボルドー	1000倍	14日	2回以内	* 剪整枝後、出来るだけ早く(3日以内)散布する。
8月中下旬	カンザワハダニ		ミルベノック乳剤	1000倍	7日	1回以内	
8月中旬～9月上旬	チャハマキ チャノコカクモンハマキ		ファルコンフロアブル	4000倍	7日	2回以内	

## (注意事項)

- クワシロカイガラムシは、地域の発生状況にあわせて防除する。
- 10㎡当りの散布量は300ℓを基準とする。ただしカンザワハダニ・チャトゲコナジラミの防除は、400ℓとする。
- 次の農薬混用組み合わせは薬害発生の事例が報告されているので混用しない。  
コテツフロアブル×ストロビーフロアブル  
ハチハチ乳剤×オンリーワンフロアブル
- 耐性菌発生を防ぐため、殺菌剤の連用は年1回まで。
- チャトゲコナジラミはすそ及び葉裏を重点に防除する。
- 「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」