

中井支店営農だより 令和6年6月



TEL 81-2776

<注意>

「収穫〇日前」：定められた使用時期。記載されている収穫前日数まで散布ができます。（前日は24時間前）
「回数」：農薬成分の総使用回数のこと。栽培期間中、何回散布可能か確認しましょう。

△△店舗により農薬の在庫状況が異なりますので、記載の農薬を購入される場合は購入先の店舗に事前に在庫確認をしていただくとスムーズに購入できます。△△

——【柑 橘】 *下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。——

病害虫防除	6月中～下旬
○黒点病	<u>シマンダイセン水和剤 600倍 166g/水100ℓ</u> <u>【温州みかん】 収穫30日前 4回</u> <u>【温州ミカンを除く】 収穫90日前 4回</u>
○ミカンハダニ	<u>アタックオイル 又は ハーベストオイル 又は スプレーオイル</u>
カイガラムシ類	<u>150倍 666ml/水100ℓ</u>
○シガビダニ	<u>ハチハチフロアブル（劇） 収穫前日 2回 2,000倍 50ml/水100ℓ</u>
アザミウマ類	<u>又はコテツフロアブル（劇） 収穫前日 2回 6,000倍 16ml/水100ℓ</u> <u>（発生園に散布）</u>

※すす病はアブラムシ・コナジラミ・カイガラムシ類の排泄物に繁殖したカビが原因であり、害虫の防除が重要になる。カイガラムシ類の多発園では下記の通りとする。

【温州みかん】アプロードエースフロアブル 収穫14日前 2回 1,000倍

【温州みかんを除く】アプロードエースフロアブル 収穫45日前 2回 1,000倍

※アプロードエースフロアブルはミカンサビダニにも効果あり。

※ミカンナガタマムシ・ゴマダラカミキリ成虫の発生園では、エクシレルSE 5,000倍 前日 3回を散布する。

摘果	（大津・青島）
大津・青島は大玉果になりやすいので、表年の樹はこの時期の摘果を控え、10月下旬からの仕上げ摘果で上を向いた極大果だけを摘果しましょう。裏年の樹は7月中旬に全摘果しましょう。	

摘果	（不知火・はるみ）
不知火・はるみは樹冠上部に着果させると樹勢の低下につながります。 生理落果が始まったら樹勢強化の為、樹冠上部1/3～1/4は全摘果し樹勢の強化を図りましょう。	

——【レモン】 *下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。——

病害虫防除	6月中旬～下旬
○黒点病	<u>シマンダイセン水和剤 収穫90日前 4回 600倍 166g/水100ℓ</u> <u>又は ペンコゼブ水和剤 収穫90日前 4回 600倍 166g/水100ℓ</u>
○ミカンハダニ	<u>アタックオイル 又は ハーベストオイル 又は スプレーオイル</u>
カイガラムシ類	<u>150倍 666ml/水100ℓ</u>
○アザミウマ類	<u>コテツフロアブル（劇） 収穫前日 2回 6,000倍 16ml/水100ℓ</u>
シガビダニ	<u>又は ハチハチフロアブル（劇） 収穫前日 2回 2,000倍 50ml/水100ℓ</u>
チャノホコリダニ	

※カイガラムシ類が前年多発した園ではアプロードエースフロアブル 収穫45日前 2回 1,000倍
又はスタークル顆粒水溶剤 収穫前日 3回 2,000倍を6月上旬に散布しましょう。アプロードエースフロアブルとスタークル顆粒水溶剤はアブラムシ類にも効果があります。スタークル顆粒水溶剤はミカンハモグリガにも効果があります。

施肥	6月上旬
夏肥施用	特選みかん配合655 160kg/10a

——【う め】 *下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。——

病害虫防除	6月上旬（漬け梅に散布）
○黒星病・すす斑病 <u>インダーフロアブル 5,000倍 収穫前日 2回 20ml/水100ℓ</u>	
収 穫	

収穫後の取扱いは丁寧におこないましょう。当たり傷はその時は目立たなくとも後日変色し、出荷先や購入者からのクレームの原因となります。

（梅干用）果実表面の毛じが半分以上脱落し、果面に光沢が出てきた頃になります。

1 樹を1 度に収穫せずに期間を空けて2回以上にわけ、未熟果は出荷をしないようにしましょう。

——【キウイフルーツ】——

病害虫防除	
6月～8月	○カメムシ発生時 <u>スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 収穫前日 3回 50g/水100ℓ</u>
6月中旬	○果実軟腐病 <u>トップジンM水和剤 1,000倍 収穫前日 5回 100g/水100ℓ</u> <u>又は フロンサイドSC 2,000倍 収穫30日前 1回 50ml/水100ℓ</u>
	○キウイハダニ <u>フェニックスフロアブル 4,000倍 収穫7日前 3回 25ml/水100ℓ</u>
夏 肥	6月上旬

キウイ配合 80kg/10a
初期肥大促進のために重要。着果が多くなる場合は、20～40kg増量します。

摘果	2回以上に分けて摘果しましょう。
・荒摘果 6月上～中旬 奇形・扁平・傷・病害・小玉果を除去。荒摘果はできるだけ早く行くと果実肥大が良好になります。	
・仕上げ摘果 6月下～7月上旬 奇形果・傷果・小玉果から摘果する。1㎡あたり25着果を目標に摘果しましょう。	

——【く り】——

病害虫防除	6月中旬～6月下旬
○アブラムシ類 <u>モスピラン顆粒水溶剤（劇） 4,000倍 収穫7日前 3回 25g/水100ℓ</u>	
○実炭疽病 <u>ベンレート水和剤 3,000倍 裂果前、但し収穫14日前まで 4回</u> <u>33g/水100ℓ</u>	

6月下旬～7月下旬	○カミキリムシ類 <u>トラサイドA乳剤 200倍 裂果前、但し収穫14日前 1回 500ml/水100ℓ</u> ※樹幹部に十分散布する。葉にかかると薬害を生じるので、注意する。
-----------	---

——【か き】 *下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。——

病害虫防除	5月下旬～6月上旬
○カキノヘタムシガ・ハマキムシ・ケムシ類	<u>フェニックスフロアブル 4,000倍 収穫7日前</u> <u>2回 25ml/水100ℓ</u>

○落葉病・うどんこ病・炭疽病	<u>スコア顆粒水和剤 3,000倍 収穫前日 3回 33g/水100ℓ</u>
追 肥	6月中下旬
柿配合 50kg/10a	

摘 果	生理落果が終了する7月中旬までに1 結果母枝2～3果にしましょう。
-----	-----------------------------------

——【いちじく】*下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。——

病害虫防除

6月上旬 ○アザミヤシ類・カキリシ類 ダントツ水溶剤 2,000倍 収穫3日前 3回 50g/水100㍓

○疫病 Zボルドー 1,000倍 (薬害軽減のためクレフノン200倍加用)

6月中下旬 ○アザミヤシ類 スピノエース顆粒水和剤 5,000倍 収穫前日 1回 20g/水100㍓

○疫病 レーバスフロアブル 2,000倍 収穫前日 3回 50ml/水100㍓

※6月～10月に園内に飛来する、カミキリムシ類の成虫を見つけた場合は直ちに捕殺する。食入部には6月～10月にロビンフッド (収穫前日 5回 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射) を使用する。(使用時のノズルは使用方法に従う)

追肥 6月～7月

生育状況に応じて、NK化成2号を20～40kg/10aを施用する。※生育が順調な場合は施用しない。

——【水稲】——

水管理 田植え後、4～5日は水温を保つため深水とします。(掛け流しはしない)

以降は3～5cm前後の深さを保ちましょう。

雑草防除 主な除草体系(例)

通常	一発処理剤(トップガンR1 [®] 粒剤など)
雑草多発田	一発処理剤+後期剤(クリンチャーバスME液剤 など)
ノビエ多発田	一発処理剤+中・後期剤(ヒエクリーン1 [®] 粒剤、クリンチャーバスME液剤、クリンチャーEW など)
コナギ多発田	一発処理剤+後期剤(バサグラン粒剤 など)
クログワイ多発田	クログワイに効果のある一発処理剤(トップガンR1 [®] 粒剤など)+後期剤(バサグラン粒剤、クリンチャーバスME液剤など)
藻類多発田	一発処理剤+モゲトン粒剤

* 水稲の一発処理剤(および初期剤)は、移植後日数の早い時期に散布するよう心がけ、散布後7日間は止め水にし、湛水状態を保ちましょう。

* 水稲除草剤の散布時期は薬剤によって異なるので、ラベルをよく確認しましょう。

——【お茶】*下線部は重要防除です。必ず防除しましょう。——

二番茶の摘採 一番茶摘採から45日後が目安となります。

病害虫防除 ※安全使用日数や周辺の摘採日程に十分留意し防除しましょう。

6月上旬～6月中旬 (二番茶摘採園)

○チャノホソガ多発時 カスケード乳剤 4,000倍 摘採7日前 2回 25ml/水100㍓

○もち病・炭疽病 オンリーワンフロアブル 3,000倍 摘採7日前 2回 33ml/水100㍓

※新梢枯死症対策として使用する場合は2,000倍 摘採7日前 2回 50ml/水100㍓とします。

※チャトゲコナジラミを対象とする場合は6月上旬に散布する。

○チャノホソガ多発時 カスケード乳剤 4,000倍 摘採7日前 2回 25ml/水100㍓

○もち病・炭疽病 オンリーワンフロアブル 3,000倍 摘採7日前 2回 33ml/水100㍓

※新梢枯死症対策として使用する場合は2,000倍 摘採7日前 2回 50ml/水100㍓とします。

6月下旬～7月上旬

○輪斑病・新梢枯死症 (輪斑病菌による)

カスミンボルドー 1,000倍 摘採14日前 2回 100g/水100㍓

*剪整枝後、出来るだけ早く(3日以内)散布しましょう。

施肥

(一番茶摘採のみの場合) 6月下旬 なたね粕 100kg/10a

(二番茶摘採を含む場合) 二番茶摘採15日前 硫安 40kg/10a

二番茶摘採後 なたね粕 100kg/10a

一番茶の芽出し肥を多く施用した方は、二番茶の芽出し肥を減らしてください。

農業を使用する際は、適用作物・希釈倍数・使用回数・使用方法等の使用基準を遵守するとともに飛散防止に努め、ラベルをよく確認し、必ずラベルに基づいて使用しましょう。

☆中井支店からのお知らせ☆

① 回覧・注文書の取りまとめについて

・防鳥資材 ・被覆植物種子 ・農産物低温貯蔵庫 ・稲干しポニー

申込締切日：令和6年6月7日(金)まで

・管内の方は、各支店(到着)までお届け下さい。

・下中管内の方は、下中集出荷場(ポスト)・前羽ポスト・下中支店(到着)までお届け下さい

② 『足柄茶』新茶取り扱いについてのご案内

中井支店にて、『足柄茶』新茶の取り扱いが始まりました。

ぜひこの機会にご賞味ください！！

○山吹(100g)	1,490円
○やまゆり(100g)	1,270円
○さかわ(100g)	1,040円
○みやがせ(100g)	840円
○さがみ(100g)	660円
○荒づくり(300g)	1,140円

③ JAのおすすめ飲料特別価格についてのご案内

中井支店ではJAのこだわり飲料を4月から10月までの期間限定価格でご案内

させていただいております。ぜひこの機会にご賞味ください！！(価格はすべて税込みです)

湘南ゴールド
290g×24本入り
3,000円
(通常より500円引き)



足柄茶リシール缶
490g×24本入り
2,600円
(通常より290円引き)



かながわ西湘 梅の風
290g×24本入り
2,400円
(通常より200円引き)

