

湯河原営農経済センターだより

令和6年8月

TEL 62-6149



西湘きんごう

○営業時間の変更について

令和6年7月31日(水) 15時まで営業

令和6年8月30日(金) 15時まで営業

○湯河原営農経済センター展示即売会のお知らせ

日次；令和6年9月7日(土) 9時～11時30分

※時間外の商品の引き渡しは準備の都合上できませんのでご了承ください。

——【温州みかん】 *下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょう。——

病害虫防除

7月下旬～8月中旬

○黒点病

シマンダイセン水和剤又はペンコゼブ水和剤 600倍 166g/水100ℓ
収穫30日前 4回

○カイガラムシ類
チャノキイロアザミウマ

コルト顆粒水和剤 3,000倍 33g/水100ℓ 収穫前日 3回

○ミカンハダニ
ミカンサビダニ
アザミウマ類

メビウスフロアブル(劇) 3000倍 33ml/水100ℓ 収穫7日前 2回

8月下旬～9月上旬

○黒点病

シマンダイセン水和剤又はペンコゼブ水和剤 600倍 166g/水100ℓ
収穫30日前 4回

○ミカンハダニ
ミカンサビダニ

ダブルフェースフロアブル 3,000倍 33ml/水100ℓ 収穫前日 1回
又は

○チャノキイロアザミウマ
ヤノネカイガラムシ

ダニゲッターフロアブル 2,000倍 50ml/水100ℓ 収穫前日 1回
スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 50g/水100ℓ 収穫前日 3回

品質向上対策

① 熟期促進を目的に、フィガロン乳剤の散布

満開後60日と80日の2回 3,000倍 300ℓ/10a

② 被覆資材の利用 敷設は8月中、取り外しは収穫前に行う

着色向上を目的の場合は、樹冠下に敷く(部分被覆)

着色向上と増糖・除草を目的の場合には、園内全体に敷く(全面被覆)

——【湘南ゴールド】——

8月下旬～9月上旬

○黒点病

シマンダイセン水和剤又はペンコゼブ水和剤 600倍 166g/水100ℓ
収穫90日前 4回

○ミカンハダニ
ミカンサビダニ

ダブルフェースフロアブル 3,000倍 33ml/水100ℓ 収穫前日 1回
又は

○チャノキイロアザミウマ
ヤノネカイガラムシ

ダニゲッターフロアブル 2,000倍 50ml/水100ℓ 収穫前日 1回
スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 50g/水100ℓ 収穫前日 3回

○かいよう病(単用散布)

コサイド3000 2,000倍 50g/水100ℓ

(薬害軽減のためクレフノン200倍を加用する)

【中晩柑】

8月下旬～9月上旬

○黒点病

ジマンダイセン水和剤又はペンコゼブ水和剤 600倍 166g/水100㍓
収穫90日前 4回

○ミカンハダニ
ミカンサビダニ

ダブルフェースフロアブル 3,000倍 33ml/水100㍓ 収穫前日 1回
又は

○チャノキロアザミウマ
ヤノネカイガラムシ

ダニゲッターフロアブル 2,000倍 50ml/水100㍓ 収穫前日 1回
スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 50g/水100㍓ 収穫前日 3回

はるみ・不知火は、初秋の乾燥で細根が枯死しやすいため、水分ストレスを受けやすく、小玉、高酸果の原因になります。敷わらマルチ、ナギナタガヤの草生栽培により梅雨明け後から秋にかけての土壌の過乾燥を防ぎましょう。著しく乾燥が続く場合は灌水も検討しましょう。また、1果当たり100葉を基準に早めの摘果をしましょう。

特にはるみは着果量が多いと樹勢の低下や枯死の原因になりますので、樹冠上部1/3から1/4は必ず全摘果をしましょう。

【レモン】 *下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょう。

病害虫防除

8月下旬～9月上旬

○ミカンハダニ

ダブルフェースフロアブル 3,000倍 33ml/水100㍓ 収穫前日 1回

ミカンサビダニ

又はダニゲッターフロアブル 2,000倍 50ml/水100㍓ 収穫前日

チャノホコリダニ

1回

○かいよう病・黒点病

コサイド3000 2,000倍 50g/水100㍓

(薬害軽減のためクレフノン200倍を加用する)

※毎年黒点病が多い園では、枯れ枝の園外廃棄を徹底し、ストロビードライフフロアブル3,000倍（収穫14日前 3回）を散布しましょう。

【う め】

病害虫防除

8月～9月

○ケムシ類

ダントツ水溶剤 2,000倍 50g/水100㍓ 収穫前日 3回

夏季剪定

8月中旬～9月中旬まで

縮間伐を行い周囲から光が当たるようにするとともに、立ち枝(覆う枝)の間引きで樹の内部まで光が入るようにして翌年の花芽の充実を図りましょう。8月中に終わると効果が高いです。

(小梅や樹勢が弱っている樹は、夏季剪定は控えめにしましょう。)

【キウイフルーツ】

夏季剪定終了後に発生した夏枝や、剪定した部分から出る新梢が巻きついた部分を取り除きます。

結果枝の葉を充実させ、果実へ養分が行きやすくするために、新梢を伸ばさないようにしましょう。

※カメムシ発生時は、スタークル顆粒水溶剤2,000倍 50g/水100㍓を散布（収穫前日 3回）

乾燥防止対策

初期肥大の時期には土壌を乾燥させないようにしましょう（敷わら・灌水）

——【か き】*下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょう。——

病害虫防除

8月上旬

○カキノハタムシガ ダントツ水溶剤 4,000倍 25g/水100㍓ 収穫7日前 3回

カメムシ類 又は

コナカイガラムシ類 スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 50g/水100㍓ 収穫前日 3回

○うどんこ病 トップジンM水和剤 1,500倍 66g/水100㍓ 収穫前日 6回

8月下旬

○うどんこ病多発園 トリフミン水和剤 3,000倍 33g/水100㍓ 収穫前日 3回

灌水

肥大促進・充実のため、梅雨明け後に乾燥が続く場合は、1週間に1回程度灌水をしましょう。

——【く り】*下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょう。——

病害虫防除

8月上旬

○実炭疽病 ベンレート水和剤 3,000倍 33g/水100㍓ 裂果前但し収穫14日前 4回

○モモノゴマダラノメイガ フェニックスフロアブル 4,000倍 25ml/水100㍓ 収穫前日 2回

干ばつ対策 土壌の乾燥を防ぐために敷きわらをしましょう。(※梅雨明け前後に)

——【お 茶】*下線が引いてあるものは重要防除です。必ず防除を行いましょう。——

土づくり

8月中旬までに苦土石灰120kgと有機物をすきこみ30cmくらいの深さに行いましょう。

病害虫防除

8月上旬～中旬

○チャノミドリヒメヨコバイ ロディー乳剤(劇) 1,000倍 100ml/水100㍓ 摘採7日前 1回

チャノキイロアザミウマ

チャノホソガ

チャハマキ

チャノコカクモンハマキ

○炭疽病 オンリーワンフロアブル 3,000倍 33ml/水100㍓ 摘採7日前 2回

8月中下旬

○カンザワハダニ ミルベノック乳剤 1,000倍 100ml/水100㍓ 摘採7日前 1回

整枝

一番茶以降、更新作業を行ってない園では、上旬をめどに整枝を行いましょう。

ただし、樹勢が極端に悪い場合は、整枝は行わないようにしましょう。

<注意>

「収穫〇日前」：定められた使用時期。記載されている収穫前日数まで散布ができます。(前日は24時間前)

「回数」：農薬成分の総使用回数のこと。栽培期間中、何回散布可能か確認しましょう。

△△店舗により農薬の在庫状況が異なりますので、記載の農薬を購入される場合は購入先の店舗に事前に在庫確認をしていただくとスムーズに購入できます。△△

農薬を使用する際は、適用作物・希釈倍数・使用回数・使用方法等の使用基準を遵守するとともに飛散防止に努め、ラベルをよく確認し、必ずラベルに基づいて使用しましょう。

ねっとショップのお知らせ

ねっとショップ3つのメリット

- 1 利便性 24時間いつでもどこからでも注文することができます。
- 2 予約機能 予約注文がねっとショップで行え、回覧での注文より値引きがあります。
- 3 検索機能 購入履歴が検索でき、以前注文した商品を簡単に再度注文できます。

現在回覧中の「秋季みかん農薬」の予約注文ですが、ネットショップに7月25日（木）～8月10日（土）の期間掲載されます。回覧で注文するよりねっとショップで注文するほうが値引きが大きくなります。是非、この機会にネットショップの登録をしてみたいでしょうか。ねっとショップ登録についてはセンター職員がお手伝いしますので、お気軽にお声掛けください。

ねっとショップ会員登録画面へのアクセス方法

<https://jac-toru.zennoh.or.jp/>

新規会員登録はこちらから



ねっとショップ新規会員登録方法

ステップ1：「新規ユーザー（登録へ）」ボタンを押す

上記QRコードを読み込むか、JAのホームページから「JAねっとショップ」にアクセスいただき「新規ユーザー（登録へ）」ボタンを押してください。

ステップ2：メールアドレスを入力

ご案内先メールアドレスを登録するとご案内メールが届きます。

ステップ3：Eメールが届きます

届いたご案内メールには、お名前や住所等を登録するためのURLが記載されています。

ステップ4：URLより会員情報登録

URLを開いて会員情報を登録してください