

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
ネキリムシ類	フォース粒剤	劇	400g/a	播種時	1回	作条土壌混和
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤		1.5~2kg/a	播種前	1回	全面土壌混和
薬 剤 散 布						
黒葉枯病	Zボルドー		500~800倍	-	-	予防剤
	ダコニール1000		1000倍	7日	5回	予防剤
斑点病	ロブラール水和剤		1000~1500倍	14日	4回	治療剤
キアゲハ	コテツフロアブル	劇	2000倍	前日	2回	
ハスモンヨトウ	プレオフロアブル		1000倍	前日	2回	

にんにく (ユリ科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
種 子 消 毒 等						
チューリップサビダニ	ガードホープ液剤	劇	500倍	植付前	1回	30分~2時間球根浸漬
黒腐菌核病	ベンレートT水和剤20		種球重量の0.5~1%		1回	種球粉衣(湿粉衣)
イモグサレセンチュウ			種球重量の1%			
薬 剤 散 布						
春腐病	銅パーシン水和剤		1000倍	7日	5回	予防+治療剤
	Zボルドー		500倍	-	-	予防剤
	バリダシン液剤5		800倍	3日	5回	治療剤
	アグリマイシン-100		1000倍	7日	3回	治療剤
軟腐病	Zボルドー		500~1000倍	-	-	予防剤
葉枯病	アミスター20フロアブル		2000倍	7日	3回	治療剤
さび病	シグナムWDG		1500倍	3日	3回	治療剤
チューリップサビダニ	ハチハチ乳剤	劇	1000倍	7日	2回	
ネギコガ・アブラムシ類・アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	劇	2000~4000倍	前日	2回	
	ハチハチ乳剤	劇	1000倍	7日	2回	

ねぎ (根深) (ユリ科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
白絹病	リゾレックス粉剤		2~3kg/a	土寄せ前但し 収穫14日前まで	3回	株元散布
ネギアザミウマ	ダントツ粒剤		600g/a	植付時	1回	植溝処理土壌混和
			300~600g/a	3日	4回	株元散布
薬 剤 散 布						
軟腐病	銅パーシン水和剤		1000倍	14日	2回	予防+治療剤
べと病	ランマンフロアブル		2000倍	3日	4回	治療剤
	リドミルゴールドMZ		1000倍	14日	3回	予防+治療剤
さび病・黒斑病	ストロビーフロアブル		2000倍	7日	3回	治療剤
	オンリーワンフロアブル		1000倍	14日	3回	治療剤
シロイチモジヨトウ	アフーム乳剤		1000~2000倍	7日	3回	
	コテツフロアブル	劇	2000倍	7日	2回	
	プレバソンフロアブル5		2000倍	3日	3回	
アブラムシ類	アグロスリン乳剤	劇	2000倍	7日	5回	
ネギハモグリバエ	アクタラ顆粒水溶剤		1000~2000倍	3日	3回	
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	劇	2000倍	7日	3回	
ネギアザミウマ	アフームエクセラ顆粒水和剤		1000倍	7日	3回	

※アフームエクセラ顆粒水和剤はアフーム乳剤と同成分を含む混合剤のため、総使用回数に注意する。
「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」