

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
種子消毒等						
乾腐病	ベンレート水和剤		50~100倍	植付前	1回	種イモの芽基部に散布
土壌施用						
根腐病	ユニフォーム粒剤		900g/a	植付時	1回	植溝土壌混和
白絹病	リブレックス水和剤		1000倍	30日	3回	治療剤 株元灌注3L/m ²
薬剤散布						
腐敗病・葉枯病	Zボルドー		500~800倍	-	-	予防剤
	アグリマイシン-100		1000倍	30日	6回	治療剤
ハスモンヨトウ	ゼンターリ顆粒水和剤		1000倍	発生初期 但し収穫前日 まで	-	

さといも (サトイモ科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
種子消毒等						
黒斑病	ベンレートT水和剤20		20倍	植付前	1回	1分間種いも浸漬
			種いも重量の 0.4~0.5%	植付前	1回	種いも粉衣
土壌施用						
コガネムシ類幼虫	ダイアジノンSLゾル		25~50倍	植付前	1回	全面土壌混和
	オンコル粒剤5		600~900g/a	生育期但し 収穫60日前	1回	株元土壌混和
薬剤散布						
ハスモンヨトウ	プレオフロアブル		1000~2000倍	7日	2回	
	プレバソンフロアブル5		2000倍	前日	3回	
アブラムシ類	アディオン乳剤		2000~3000倍	7日	5回	

さやいんげん (マメ科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土壌施用						
アブラムシ類	アドマイヤー1粒剤		1~2g/株 但し600g/aまで	播種時又は 定植時	1回	植穴土壌混和
薬剤散布						
菌核病	セイビアーフロアブル20		1000~1500倍	前日	3回	予防剤
ハダニ類	ダニトロンフロアブル		1000~2000倍	前日	1回	
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	劇	2000~4000倍	前日	3回	
	スタークル顆粒水溶剤		2000倍	前日	2回	
ハモグリバエ類	アフーム乳剤		2000倍	前日	2回	
	プレバソンフロアブル5		2000倍	前日	3回	

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」