

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
<b>土 壌 施 用</b>						
アブラムシ類	モスピラン粒剤		300g/a	播種時	1回	播溝土壌混和
キシジノミハムシ	フォース粒剤	劇	400～900g/a	播種時	1回	播溝土壌混和
			600～900g/a	播種時	1回	全面土壌混和
	ダイアジノン粒剤5		600g/a	播種時及び生育期、 但し収穫21日前まで	2回	播種時：作条土壌混和 作物生育中：株元土壌混和
タネバエ	フォース粒剤	劇	400g/a	播種時	1回	播溝土壌混和
	ダイアジノン粒剤5		400～600g/a	播種時	1回	全面土壌混和または 作条土壌混和
ネキリムシ類			600g/a	生育期、但し 収穫21日前まで	1回	土壌表面散布
ネグサレセンチュウ	ネマトリンエース粒剤		1.5kg～2.5kg/a	播種前	1回	全面土壌混和
<b>薬 剤 散 布</b>						
白さび病・わかか症	アミスター20フロアブル		2000倍	14日	3回	治療剤
	ランマンフロアブル		2000倍	3日	3回	治療剤
黒斑細菌病・軟腐病	カッパーシン水和剤		1000倍	14日	3回	予防+治療剤
	カセット水和剤		1000倍	14日	3回	治療剤
アブラムシ類	ウララDF		2000倍	前日	2回	
	ベストガード水溶剤		1000～2000倍	7日	3回	
ハイマダラノメイガ (ダイコンシンクイムシ)	アクセルフロアブル		1000～2000倍	7日	2回	
	フェニックス顆粒水和剤		2000～4000倍	7日	2回	
コナガ	アフーム乳剤		1000～2000倍	7日	3回	
	コテツフロアブル	劇	2000倍	14日	2回	
ヨトウムシ	ディアナSC		2500～5000倍	前日	2回	

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」