

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
コナジラミ類・アザミウマ類	スタークル粒剤		1～2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和
アブラムシ類	スタークル粒剤		1g/株	定植時	1回	植穴土壌混和
薬 剤 散 布						
褐色腐敗病	プロポーズ顆粒水和剤		1000倍	前日	4回	予防+治療剤
灰色かび病	ロブラール水和剤		1000～1500倍	前日	4回	治療剤
うどんこ病	ベルコートフロアブル		2000倍	前日	3回	治療剤
	アフエットフロアブル		2000倍	前日	3回	治療剤
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	劇	2000～4000倍	前日	3回	
アザミウマ類	ディアナSC		2500～5000倍	前日	2回	
	モスピラン顆粒水溶剤	劇	2000～4000倍	前日	3回	
	モベントフロアブル		2000倍	前日	3回	
ハダニ類	マイトコーネフロアブル		1000倍	前日	1回	
チャノホコリダニ	コテツフロアブル	劇	2000倍	前日	4回	
	モベントフロアブル		2000倍	前日	3回	
コナジラミ類	チェス顆粒水和剤		5000倍	前日	3回	
	モスピラン顆粒水溶剤	劇	2000倍	前日	3回	
テントウムシダマシ類	アディオン乳剤		2000倍	前日	3回	
ハスモンヨトウ	コテツフロアブル	劇	2000倍	前日	4回	
	プレオフロアブル		1000倍	前日	4回	
	アフアーム乳剤		2000倍	前日	2回	
ハモグリバエ類	プレバゾンフロアブル5		1000～2000倍	前日	2回	

なばな (アブラナ科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
根こぶ病	ネビジン粉剤		2～3kg/a	播種 又は定植前	1回	全面土壌混和
コガネムシ類幼虫・ネキリムシ類・ケラ	ダイアジノン粒剤5		600g/a	播種時	1回	全面土壌混和
薬 剤 散 布						
軟腐病	ヨネポン水和剤		500倍	14日	3回	
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	劇	4000倍	14日	1回	
ハスモンヨトウ	コテツフロアブル	劇	2000倍	3日	2回	
コナガ・アオムシ	アフアーム乳剤		1000～2000倍	7日	2回	

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」