

らっかせい (マメ科)

【令和7年1月1日現在の農薬登録内容】2025版

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
コガネムシ類幼虫	フォース粒剤	劇	900g/a	播種時	1回	播溝土壌混和又は全面土壌混和
薬 剤 散 布						
褐斑病・黒渋病・灰色かび病	トップジンM水和剤		1500～2000倍	7日	4回	治療剤 早めに散布する
汚斑病	スミレックス水和剤		1000～2000倍	21日	4回	治療剤 8月下旬に散布
アブラムシ類	スミチオン乳剤		1000～2000倍	21日	4回	

らっきょう (ユリ科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
種 子 消 毒 等						
黒球病	トリフミン水和剤		50倍	植付前	1回	5分間種球浸漬
乾腐病						5～30分間種球浸漬
ネダニ類	スミチオン乳剤		1000～2000倍	植付前	1回	30分間種球浸漬
土 壌 施 用						
根腐病	ガスタード微粒剤	劇	3kg/a	植付21日前	1回	所定量を均一に散布して土壌と混和する。 ガス抜き必要
ネダニ	ネマトリンエース粒剤		1.5kg/a	植付前	1回	播溝土壌混和
薬 剤 散 布						
灰色かび病	ロブラール水和剤		1000倍	30日	3回	治療剤
	フロンサイド水和剤		2000倍	14日	5回	予防剤
白色疫病	ランマンフロアブル		2000倍	3日	4回	治療剤

レタス (キク科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5		600g/a	播種時又は定植時	2回	土壌表面散布
	カルホス微粒剤F	劇	600g/a	播種時又は植付時	2回	土壌表面散布土壌混和処理
薬 剤 散 布						
菌核病	ゲッター水和剤		1500倍	7日	2回	治療剤
	シグナムWDG		1500倍	7日	2回	治療剤
	ファンジスタ顆粒水和剤		2000～3000倍	3日	3回	治療剤
腐敗病・軟腐病	キノンドーフロアブル		800～1000倍	21日	5回	予防剤
	スターナ水和剤		2000倍	7日	2回	治療剤
	バリダシン液剤5		800倍	前日	3回	治療剤
ハスモンヨトウ・ナモグリバエ	アフアーム乳剤		1000～2000倍	3日	3回	
	プレオフロアブル		1000倍	7日	2回	
ハスモンヨトウ	プレバソフフロアブル5		2000倍	前日	3回	
ハモグリバエ類			1000～2000倍	前日	3回	

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」