

フロッコリー

(アブラナ科)

【令和7年1月1日現在の農薬登録内容】2025版

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
根こぶ病	ネビジン粉剤		2～3kg/a	播種 又は定植前	1回	全面土壌混和
コナガ	モスピラン粒剤		1～2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和
薬 剤 散 布						
べと病	ダコニール1000		1000倍	出蕾前 但し 収穫21日前 まで	2回	予防剤
	ランマンフロアブル		2000倍	3日	3回	治療剤
花蕾腐敗病	Zボルドー		500倍	—	—	予防剤
軟腐病	スターナ水和剤		2000倍	14日	2回	治療剤
アブラムシ類	ハチハチ乳剤	劇	1000～2000倍	7日	2回	
	モスピラン顆粒水溶剤	劇	2000倍	14日	3回	
コナガ	アフーム乳剤		1000～2000倍	3日	3回	
	ブレオフロアブル		1000倍	7日	2回	
オオタバコガ	アフーム乳剤		1000～2000倍	3日	3回	
	ディアナSC		2500～5000倍	前日	2回	
ハイマダラノメイガ (シンクイムシ)	フェニックス顆粒水和剤		2000～4000倍	前日	2回	
コナガ・アオムシ	コテツフロアブル	劇	2000倍	3日	2回	

ほうれんそう

(アカザ科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
タネバエ	ダイアジノン粒剤5		600g/a	播種時	1回	作条土壌混和又は 土壌表面散布
ネキリムシ類	ガードベイトA		300g/a	生育初期	2回	株元散布
薬 剤 散 布						
べと病	ランマンフロアブル		2000倍	3日	3回	治療剤
アブラムシ類 (モザイク病)	アグロスリン乳剤	劇	2000倍	7日	5回	早めに防除する
	アディオン乳剤		3000倍	14日	2回	
	ウララDF		4000倍	前日	2回	
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤		5000倍	前日	2回	
ヨトウムシ	ノーモルト乳剤		2000倍	7日	2回	
ハスモンヨトウ・ ハウレンソウケナガコナダニ	アフーム乳剤		2000倍	3日	2回	
	カスケード乳剤		4000倍	3日	3回	

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」