

| 病害虫名 | 農薬名 | 区分 | 使用濃度 | 収穫前日数 | 使用回数 | 備考 |
|----------------|-------------|----|------------|-------|------|----------|
| 土 壌 施 用 | | | | | | |
| アブラムシ類 | スタークル粒剤 | | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 |
| | ベストガード粒剤 | | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 |
| コナジラミ類 | スタークル粒剤 | | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 |
| | ベストガード粒剤 | | 1~2g/株 | 育苗期 | 1回 | 株元処理 |
| | | | 1~2g/株 | 定植時 | | 植穴処理土壌混和 |
| 薬 剤 散 布 | | | | | | |
| 疫病 | ダコニール1000 | | 1000倍 | 前日 | 2回 | 予防剤 |
| | プロポーズ顆粒水和剤 | | 1500倍 | 前日 | 2回 | 予防+治療剤 |
| 灰色かび病 | ロブラール水和剤 | | 1000~1500倍 | 前日 | 3回 | 治療剤 |
| 葉かび病 | トリフミン水和剤 | | 3000~5000倍 | 前日 | 5回 | 治療剤 |
| | ベルコートフロアブル | | 4000倍 | 前日 | 2回 | 治療剤 |
| アブラムシ類 | チェス顆粒水和剤 | | 5000倍 | 前日 | 3回 | |
| | モスピラン顆粒水溶剤 | 劇 | 2000倍 | 前日 | 3回 | |
| コナジラミ類 | アニキ乳剤 | | 1000~2000倍 | 前日 | 3回 | |
| ハモグリバエ類 | ディアナSC | | 2500~5000倍 | 前日 | 2回 | |
| オオタバコガ | ディアナSC | | 2500~5000倍 | 前日 | 2回 | |
| | プレオフロアブル | | 1000倍 | 前日 | 2回 | |
| | プレバソンフロアブル5 | | 2000倍 | 前日 | 3回 | |

※プロポーズ顆粒水和剤はダコニール1000と同成分を含む混合剤のため、総使用回数に注意する。

みずな (アブラナ科)

| 病害虫名 | 農薬名 | 区分 | 使用濃度 | 収穫前日数 | 使用回数 | 備考 |
|-----------------|------------|----|------------|-------|------|-----------------|
| 土 壌 施 用 | | | | | | |
| アブラムシ類 | ダントツ粒剤 | | 600g/a | 播種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 |
| 薬 剤 散 布 | | | | | | |
| 立枯病 | ダコニール1000 | | 1000倍 | 播種時 | 1回 | 1㎡あたり3L 土壌灌注 |
| 軟腐病 | ヨネポン水和剤 | | 500倍 | 14日 | 4回 | 予防剤 |
| キシジノミハムシ・アブラムシ類 | モスピラン顆粒水溶剤 | 劇 | 4000倍 | 7日 | 1回 | |
| コナガ・アオムシ | カスケード乳剤 | | 2000倍 | 7日 | 2回 | |
| | アフーム乳剤 | | 1000~2000倍 | 7日 | 3回 | |

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」