

## アスパラガス (ユリ科)

【令和7年1月1日現在の農薬登録内容】2025版

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
<b>薬剤散布</b>						
茎枯病	コサイド3000		2000倍	—	—	予防剤
	アフエットフロアブル		2000倍	前日	4回	治療剤
	トップジンM水和剤		1000倍	収穫開始 7日前まで	5回	治療剤
	ダコニール1000		1000倍	前日	4回	予防剤
ハスモンヨトウ	アフーム乳剤		2000倍	前日	2回	
	コテツフロアブル	劇	2000倍	前日	2回	
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	劇	4000倍	前日	2回	
アザミウマ類						
	ディアナSC		2500～5000倍	前日	2回	

## えだまめ (マメ科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
<b>土壌施用</b>						
アブラムシ類	アドマイヤー1粒剤		300g/a	播種時	1回	播溝土壌混和
<b>薬剤散布</b>						
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	劇	4000倍	7日	3回	
マメヒメサヤムシガ	スミチオン乳剤		1000倍	21日	4回	
カメムシ類	キラップフロアブル		2000倍	7日	2回	
	ダントツ水溶剤		2000～4000倍	前日	3回	
ハスモンヨトウ	アフーム乳剤		1000～2000倍	3日	2回	

## オクラ (アオイ科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
苗立枯病 (リゾクトニア菌)	リゾレックス水和剤		1000倍	播種時及び 子葉展開時	2回	1 $\frac{1}{2}$ ℓ/m <sup>2</sup> (150ml/穴) 植穴土壌灌注
<b>土壌施用</b>						
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤		2kg/a	播種前	1回	全面土壌混和
<b>薬剤散布</b>						
うどんこ病	トリフミン水和剤		5000倍	前日	3回	治療剤
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	劇	4000倍	前日	3回	
	チェス顆粒水和剤		6000倍	前日	3回	
オオタバコガ	アフーム乳剤		2000倍	前日	2回	
	コテツフロアブル	劇	2000倍	前日	2回	
ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5		2000倍	前日	3回	

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」