

※ 太枠は重要防除になります。

| 月(時期)              | 対象病虫害                                                                                    | 区分 | 使用農薬(倍率)                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 12月下旬<br>～<br>3月上旬 | カイガラムシ類                                                                                  |    | 石灰硫黄合剤 7倍                                                                         |
|                    | 苗木は株枯病抵抗性台木の脇広台を導入する。                                                                    |    |                                                                                   |
| 4月                 | カミキリムシ類<br>アイノキクイムシ                                                                      |    | ガットサイドS 株元から結果母枝まで原液塗布 又は 主幹部に1.5倍塗布<br>(注 1.5倍塗布はアイノキクイムシのみに登録あり)<br>(収穫7日前まで3回) |
|                    | 注)カミキリムシ類の虫糞が見られたらロビンフットを使用する(使用時のノズルは使用方法に従う)。                                          |    |                                                                                   |
| 5月上中旬              | ネコブセンチュウ                                                                                 |    | ネマトリンエース粒剤 2kg/a (収穫60日前まで1回)<br>(樹幹下処理、土壌によく混和する)                                |
| 6月上旬               | アザミウマ類・カミキリムシ類                                                                           |    | ダントツ水溶剤 2000倍 (収穫3日前まで3回)                                                         |
|                    | 疫病                                                                                       |    | Zボルドー 1000倍<br>(薬害軽減のためクレフノン200倍を加用する)                                            |
|                    | 注)6月～10月に園内に飛来する、カミキリムシ類の成虫を見つけた場合は直ちに捕殺する。<br>食入部には6月～10月にロビンフットを使用する(使用時のノズルは使用方法に従う)。 |    |                                                                                   |
| 6月中下旬              | アザミウマ類                                                                                   |    | スピノエース顆粒水和剤 5000倍 (収穫前日まで1回)                                                      |
|                    | 疫病                                                                                       |    | レーバスフロアブル 2000倍 (収穫前日まで3回)                                                        |
| 7月上旬               | アザミウマ類<br>キボシカミキリ<br>カイガラムシ類                                                             | 劇  | モスピラン顆粒水溶剤 2000倍 (収穫前日まで3回)                                                       |
|                    | 疫病                                                                                       |    | ランマンフロアブル 2000倍 (収穫前日まで3回)                                                        |
| 7月下旬<br>(梅雨明後)     | ヒラズハナアザミウマ                                                                               | 劇  | コテツフロアブル 2000倍 (収穫前日まで2回)                                                         |
|                    | さび病                                                                                      |    | トリフミン水和剤 2000倍 (収穫前日まで3回) 又は<br>フルーツセイバー 1500倍 (収穫前日まで3回)                         |
| 8月上旬<br>(収穫最盛期)    | アザミウマ類                                                                                   | 劇  | スカウトフロアブル 2000倍 (収穫前日まで3回)                                                        |
|                    | さび病                                                                                      |    | アンビルフロアブル 1000倍 (収穫前日まで2回)                                                        |
| 8月下旬               | ハダニ類                                                                                     |    | マイトコーネフロアブル 1000倍 (収穫前日まで1回)<br>ダニサラバフロアブル 1000倍 (収穫前日まで2回)                       |
|                    | 疫病・さび病                                                                                   |    | アミスター10フロアブル 1000倍 (収穫前日まで3回)                                                     |
| 9月<br>(秋雨前)        | 疫病                                                                                       |    | ランマンフロアブル 2000倍 (収穫前日まで3回)                                                        |

## ○アザミウマ対策

5月中下旬から光反射シートを設置することで、アザミウマ類を抑制できる。

## ○株枯れ病対策

株枯病は土壌病害なので、蔓延防止のため、湛水、かけ流し灌水は行わない。

## ○疫病対策

- ・雨による泥はねを防ぐため、梅雨入り前に主幹直下を含め敷わら又はマルチの敷設をする。
- ・罹病葉、罹病果は、すみやかに園外に除去する。
- ・落葉、落果などは園外廃棄をする。

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」