

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
アブラムシ類	スタークル粒剤		1g/株	定植時	1回	植穴土壌混和
	ベストガード粒剤		1～2g/株	定植時	1回	植穴処理土壌混和
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5		400～600g/a	播種時又は定植時	2回	全面土壌混和又は作条土壌混和
薬 剤 散 布						
斑点細菌病	カッパーシン水和剤		1000倍	前日	5回	予防+治療剤
アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤		3000倍	前日	2回	
	アーデント水和剤		1000倍	前日	2回	
	ウララDF		2000～4000倍	前日	2回	
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	劇	4000倍	前日	2回	
	アグリメック	劇	500～1000倍	前日	3回	
	スタークル顆粒水溶剤		2000倍	前日	2回	
オオタバコガ	アフーム乳剤		2000倍	前日	2回	

非結球レタス(リーフレタス) (キク科)

病害虫名	農薬名	区分	使用濃度	収穫前日数	使用回数	備考
土 壌 施 用						
ネキリムシ類	カルホス微粒剤F	劇	600g/a	播種時又は植付時	2回	土壌表面散布土壌混和処理
薬 剤 散 布						
菌核病	トップジンM水和剤		1500～2000倍	21日	2回	治療剤
	ファンタジスタ顆粒水和剤		2000～3000倍	14日	3回	治療剤
腐敗病・軟腐病・すそ枯病	バリダシン液剤5		800倍	3日	3回	治療剤
ハスモンヨトウ・ナモグリバエ	アフーム乳剤		1000～2000倍	3日	3回	
ハスモンヨトウ・ハモグリバエ類	プレバソンフロアブル5		2000倍	前日	3回	

「農薬の使用は、使用基準を確認し、周りの他作物に農薬が飛散しないようにすること」