

タマネギべと病 防除推奨日（予測日：2/20、予測期間：2/20～2/28）

	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土
天気 <sup>z</sup>	晴/曇	晴	晴/曇	曇/晴	曇	雨/曇	晴/雨	曇/雨	雨/曇
防除推奨日 <sup>y</sup>	-	○	○	○	○	△	△	△	△

z: 日本気象協会の予報（小田原市）より

y: ○ 防除推奨日（降雨がなく、前回の薬剤散布から1週間以上経っていた場合、散布を推奨）

△ 防除候補日（降雨が予想される日ですが、雨が降るまでに6時間以上あれば、散布を推奨）

※散布後すぐに雨が降ると、薬剤が流れ、効果が薄まる恐れがあります。

べと病は好適な気温と湿度があると胞子をつくり、風で飛散し伝染します。そのため、地域全体で防除を行うことが推奨されます。

本表は、佐賀県農業技術センターの試験結果をもとに本県が作成し、試験的に掲示しております。

防除推奨日は気象予報から算出した予測値であり、実際の気象条件や場所によって変わることがあります。べと病防除の予定作成の一助としてください。

神奈川県農業技術センター 企画経営部 担当：野間 TEL:0463-58-0333(内線:309)