

タマネギべと病 防除推奨日（予測日：2/25、予測期間：2/25～3/5）
予測地点：小田原市小竹周辺

	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木
天気 ^z	雨	雨/晴	晴/曇	曇/晴	晴/曇	曇	曇/雨	雨/曇	晴/雨
防除推奨日 ^y	△	△	－	－	○	○	△	△	－

z：日本気象協会の予報（小田原市）より
y：○ 防除推奨日（降雨がなく、前回の薬剤散布から1週間以上経っていた場合、散布を推奨）
△ 防除候補日（降雨が予想される日ですが、雨が降るまでに6時間以上あれば、散布を推奨）
※散布後すぐに雨が降ると、薬剤が流れ、効果が薄まる恐れがあります。

べと病は好適な気温と湿度があると胞子をつくり、風で飛散し伝染します。そのため、地域全体で防除を行うことが推奨されます。
本表は、佐賀県農業技術センターの試験結果をもとに本県が作成し、試験的に掲示しております。
防除推奨日は気象予報から算出した予測値であり、実際の気象条件や場所によって変わることがあります。べと病防除の予定作成の一助としてください。

神奈川県農業技術センター 企画経営部 担当：野間 TEL：0463-58-0333（内線：309）