

中井支店営農だより① 令和8年3月

TEL 81-2776

中井支店では、決算棚卸の為、営業時間を

3月31(火)8:40~12:00まで 4月1日(水)13:00~16:00といたします。

ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただきますようお願い申し上げます。



【温州みかん】

施肥 3月中下旬

○特選みかん配合 655 160kg/10a 施肥後、軽く中耕を行いましょ。

※特選みかん配合 655 には 微量元素 が含まれています。

数年に一度は微量元素欠乏対策の為、特選みかん配合 655 を使用しましょ。

石灰資材の施用

○顆粒タイニー 又は 苦土タンカル 200kg/10a

石灰資材をここ数年施肥していない園(又は、1~2月に石灰資材を施用していない園)では、根の活動が低下し、養分の欠乏をひきおこす可能性があるため必ず施用し中耕しましょ。

尚、春肥とは最低でも2週間以上あけてください。

病害虫防除 3月中下旬

○かいよう病・そうか病対策

病斑のある枝葉は、新葉が出てくるときに感染源となるので、剪定時に取り除いて園内から持ち出し病原菌の密度を低くしましょ。

○かいよう病

コサイド 3000 1,000 倍 100g/100 畝 (クレフノン 200 倍 500g/水 100 畝加用)

※マシン油乳剤と混用散布は避け、近接散布は最低2週間以上あけましょ。

※温州みかん園に中晩柑類(ネーブル・レモン等)が混植されている場合には防除を必ず行いましょ。

※この時期に散布できなかった園は4月上旬にコサイド 3000 2000 倍 50g/水 100 畝

(クレフノン 200 倍 500g/水 100 畝加用) 又はイデクリーン水和剤 500 倍 200g/水 100 畝

(クレフノン 200 倍 500g/水 100 畝加用) を散布しましょ。

【湘南ゴールド】

剪定

温州みかんと同じ開心自然型とします。しかし、温州みかん同様の剪定では強すぎるため、主枝や垂主枝を竹などで開張し、逆行枝、側枝の重なり枝の間引き剪定と下垂枝の切り返し程度に控え、樹冠内部に光が入る様にしましょ。

結実し始めた樹は弱剪定で樹形が乱れているので、剪定量を増やし樹形を徐々に改善しましょ。

施肥 3月中下旬

特選みかん配合 655 140 kg/10a 施肥後に軽い中耕を行う。

収穫後

○かいよう病(収穫後)

I Cボルドー66D 100 倍 1,000ml/100 畝 (アピオンE 1,000 倍 100ml/100 畝加用)

ムッシュボルドーDF 1,000 倍 100g/100 畝 (クレフノン 200 倍 500g/100 畝加用)

発芽前であればアピオンE、クレフノンの加用の必要はない。

※病斑のついた枝は剪定時に園外へ持ち出す。I Cボルドー66Dはマシン油との散布間隔は14日以上開ける。

【中晩柑】

不知火・はるみの剪定

主枝先端を明確にして、直径1cmぐらいのところを切り返し、予備枝(坊主枝)を作り、新梢を発生させ樹勢の維持を行います。

翌年の結果母枝の確保のため、鉛筆位の太さの予備枝(坊主枝)を、亜主枝に対して1本設けましょう。はるみは主枝先端部の切り返しを強めに行い、不知火はやや強めの切り返しにとどめる。はるみ程強く切り返す必要はない。

施肥 特選みかん配合 655 140 kg/10a 施肥後に軽い中耕を行う。

病害虫防除

はるみ・レモン・ネーブル等は、かいよう病に罹病しやすいので、湘南ゴールドの項を参照に防除して下さい。

【レモン】

整枝剪定

特に若木は樹勢が強く花芽が付きにくいので、樹勢が落ち着くまでの整枝剪定は、整枝を主体とし、徒長枝や混み合う枝の間引きを軽く行う程度とする。また、花芽が着く春枝の先端は切り返さない。枝は立ち性で太く放置すると高くなるので、枝を下げ誘引する。

樹勢が落ち着いてきたら、徐々に剪定量を増やし、関心自然形にしていくが、樹勢が強いため、過度の剪定は徒長枝が多発し結果しなくなるので注意が必要です。樹幹内の枯れ枝は黒点病防除のため、常に除去するように心がける。

春肥施用 (3月中旬頃)

特選みかん配合 655 160kg/10a 施肥後、軽く中耕を行う。

収穫後

かいよう病 IC ボルドー66D 100倍 1ℓ/水100ℓ (アピオンE 1,000倍 100ml/100ℓ加用)
又は ムッシュボルドーDF 1,000倍 100g/水100ℓ (クレフノン 200倍 500g/100ℓ加用)
発芽前であればアピオンE、クレフノンの加用は必要ない。

【う め】

施肥 3月中旬 ○梅配合 80kg/10a (樹勢を安定させ着果後の肥大促進を目的)

病害虫防除 3月上旬～3月下旬

○かいよう病 コサイド3000 2,000倍 硬核期まで 50g/100ℓ (クレフノン 200倍 500g/100ℓ加用)

※この時期のかいよう病防除は重要防除になります。必ず散布し、加工果実を減らしましょう。

3月中旬～下旬

○アブラムシ類 スミチオン乳剤 収穫14日前 2回 2,000倍 50ml/水100ℓ 又は

チェス顆粒水和剤 収穫21日前 2回 5,000倍 20g/水100ℓ

○灰色かび病・黒星病 ベルクートフロアブル 収穫30日前 3回 2000倍 50ml/水100ℓ

※灰色かび病の防除適期は落弁期(花びらの80%が散った時期)であるが品種によって開花時期が異なるので状態に合わせて防除する。

<黒星病の防除について>

黒星病の発生が非常に多くなっています! 4月上旬～中旬、下旬、5月上旬の春先の防除が有効になりますので徹底しましょう! 特に、5月上旬の防除をされていない園は、4月の防除に加え今年は必ず防除をするようにしましょう!

4月上旬 デランフロアブル 収穫14日前 2回 2000倍 50ml/水 100ℓ 又は

～ ペンコゼブフロアブル 収穫前21日前 3回 1000倍 100ml/水 100ℓ

4月中旬

4月下旬 ストロビードライフフロアブル 収穫7日前 3回 3,000倍 33g/水 100ℓ

5月上旬 スコア顆粒水和剤 収穫前日 3回 3,000倍 33g/水 100ℓ

*2週間間隔で散布しましょう。*前年の被害枝は切除しましょう。